

10 特定健康診査 ・特定保健指導

1) 特定健康診査の状況

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(令和2年度)

| | | 石川県 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|--------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 対象者数 | | 160,547 | 21,058 | 8,633 | 3,663 | 3,771 | 2,142 | 2,849 |
| 特定健康診 | 受診者数 | 64,480 | 9,108 | 3,065 | 1,738 | 1,861 | 1,243 | 1,201 |
| | 受診率 | 40.2% | 43.3% | 35.5% | 47.4% | 49.4% | 58.0% | 42.2% |
| | 評価対象者 | 64,492 | 9,113 | 3,065 | 1,738 | 1,862 | 1,245 | 1,203 |
| 特定保健指導 | 対象者 | 6,496 | 989 | 338 | 198 | 162 | 141 | 150 |
| | 率 | 10.1% | 10.9% | 11.0% | 11.4% | 8.7% | 11.3% | 12.5% |
| | 利用者 | 3,296 | 772 | 303 | 176 | 102 | 108 | 83 |
| | 率 | 50.7% | 78.1% | 89.6% | 88.9% | 63.0% | 76.6% | 55.3% |
| | 終了者 | 3,032 | 743 | 292 | 172 | 102 | 94 | 83 |
| 実施率 | 46.7% | 75.1% | 86.4% | 86.9% | 63.0% | 66.7% | 55.3% | |

※石川県の数は市町国保の合計とする。

2) 特定保健指導の状況(積極的支援)

(令和2年度)

| | | 石川県 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 評価対象者 | | 64,492 | 9,113 | 3,065 | 1,738 | 1,862 | 1,245 | 1,203 | |
| 積極的支援 | 対象者 | 1,295 | 188 | 68 | 39 | 29 | 22 | 30 | |
| | 率 | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 1.6% | 1.8% | 2.5% | |
| | 利用者 | 人数 | 574 | 132 | 56 | 32 | 17 | 15 | 12 |
| | | 率 | 44.3% | 70.2% | 82.4% | 82.1% | 58.6% | 68.2% | 40.0% |
| | 終了者 | 人数 | 389 | 108 | 48 | 28 | 17 | 3 | 12 |
| | | 率 | 30.0% | 57.4% | 70.6% | 71.8% | 58.6% | 13.6% | 40.0% |
| | 中断者率 | 32.2% | 18.2% | 14.3% | 12.5% | 0.0% | 80.0% | 0.0% | |
| | 服薬除外者 | 2,386 | 335 | 121 | 65 | 54 | 46 | 49 | |

※石川県の数は市町国保の合計とする。

3) 特定保健指導の状況(動機付け支援)

(令和2年度)

| | | 石川県 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 評価対象者 | | 64,492 | 9,113 | 3,065 | 1,738 | 1,862 | 1,245 | 1,203 | |
| 動機付け支援 | 対象者 | 5,201 | 801 | 270 | 159 | 133 | 119 | 120 | |
| | 率 | 8.1% | 8.8% | 8.8% | 9.1% | 7.1% | 9.6% | 10.0% | |
| | 利用者 | 人数 | 2,722 | 640 | 247 | 144 | 85 | 93 | 71 |
| | | 率 | 52.3% | 79.9% | 91.5% | 90.6% | 63.9% | 78.2% | 59.2% |
| | 終了者 | 人数 | 2,643 | 635 | 244 | 144 | 85 | 91 | 71 |
| | | 率 | 50.8% | 79.3% | 90.4% | 90.6% | 63.9% | 76.5% | 59.2% |
| | 中断率 | 2.9% | 0.8% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | |
| | 服薬除外者 | 16,821 | 2,560 | 833 | 423 | 585 | 394 | 325 | |

※石川県の数は市町国保の合計とする。

4) 内臓脂肪症候群・服薬に関する状況

(令和2年度)

| | | 石川県 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|------------|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 評価対象者 | | 64,492 | 9,113 | 3,065 | 1,738 | 1,862 | 1,245 | 1,203 |
| 内臓脂肪症候群 | 人数 | 15,629 | 2,404 | 805 | 433 | 486 | 364 | 316 |
| | 率 | 24.2% | 26.4% | 26.3% | 24.9% | 26.1% | 29.2% | 26.3% |
| 内臓脂肪症候群予備群 | 人数 | 6,910 | 921 | 293 | 161 | 197 | 150 | 120 |
| | 率 | 10.7% | 10.1% | 9.6% | 9.3% | 10.6% | 12.0% | 10.0% |
| 高血圧症の治療 | 人数 | 26,998 | 3,996 | 1,305 | 703 | 922 | 563 | 503 |
| | 率 | 41.9% | 43.8% | 42.6% | 40.4% | 49.5% | 45.2% | 41.8% |
| 脂質異常症の治療 | 人数 | 21,778 | 3,027 | 1,015 | 570 | 638 | 424 | 380 |
| | 率 | 33.8% | 33.2% | 33.1% | 32.8% | 34.3% | 34.1% | 31.6% |
| 糖尿病の治療 | 人数 | 7,381 | 1,125 | 395 | 185 | 209 | 162 | 174 |
| | 率 | 11.4% | 12.3% | 12.9% | 10.6% | 11.2% | 13.0% | 14.5% |

※石川県の数は市町国保の合計とする。

5) 特定健康診査

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(令和2年度)

| | 石川県 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|--|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 受診者数 | 66,601 | 9,373 | 3,141 | 1,819 | 1,901 | 1,284 | 1,228 | |
| 腹囲 男性85cm以上 女性:90cm以上 または BMI 25以上 | 28,194 | 4,199 | 1,394 | 762 | 859 | 625 | 559 | |
| (%) | 42.3% | 44.8% | 44.4% | 41.9% | 45.2% | 48.7% | 45.5% | |
| 腹囲 | 男性:85cm未満 女性:90cm未満 | 41,406 | 5,706 | 1,933 | 1,151 | 1,155 | 718 | 749 |
| | (%) | 62.2% | 60.9% | 61.5% | 63.3% | 60.8% | 55.9% | 61.0% |
| | 男性:85cm以上 女性:90cm以上 | 25,192 | 3,667 | 1,208 | 668 | 746 | 566 | 479 |
| | (%) | 37.8% | 39.1% | 38.5% | 36.7% | 39.2% | 44.1% | 39.0% |
| 実施せず | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| BMI | 18.5未満 | 4,597 | 528 | 165 | 126 | 93 | 69 | 75 |
| | (%) | 6.9% | 5.6% | 5.3% | 6.9% | 4.9% | 5.4% | 6.1% |
| | 18.5～25未満 | 43,327 | 5,920 | 1,982 | 1,195 | 1,180 | 817 | 746 |
| | (%) | 65.1% | 63.2% | 63.1% | 65.7% | 62.1% | 63.6% | 60.7% |
| 25以上 | 18,669 | 2,924 | 994 | 498 | 627 | 398 | 407 | |
| (%) | 28.0% | 31.2% | 31.6% | 27.4% | 33.0% | 31.0% | 33.1% | |
| 実施せず | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 血圧 | 異常なし ~129 and ~84 | 32,506 | 4,349 | 1,404 | 921 | 882 | 614 | 528 |
| | (%) | 48.8% | 46.4% | 44.7% | 50.6% | 46.4% | 47.8% | 43.0% |
| | 保健指導判定 130~139 or 85~ | 16,410 | 2,399 | 808 | 479 | 456 | 342 | 314 |
| | (%) | 24.6% | 25.6% | 25.7% | 26.3% | 24.0% | 26.6% | 25.6% |
| 受診勧奨判定 140~ or 90~ | 17,682 | 2,624 | 929 | 419 | 563 | 328 | 385 | |
| (%) | 26.5% | 28.0% | 29.6% | 23.0% | 29.6% | 25.5% | 31.4% | |
| 不明・検査せず | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |

5) 特定健康診査

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(令和2年度)

| | 石川県 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 受診者数 | 66,601 | 9,373 | 3,141 | 1,819 | 1,901 | 1,284 | 1,228 | |
| 中性脂肪 | 異常なし ~149 | 49,010 | 6,616 | 2,223 | 1,239 | 1,380 | 902 | 872 |
| | (%) | 73.6% | 70.6% | 70.8% | 68.1% | 72.6% | 70.2% | 71.0% |
| | 保健指導判定 150~299 | 15,155 | 2,356 | 788 | 489 | 443 | 328 | 308 |
| | (%) | 22.8% | 25.1% | 25.1% | 26.9% | 23.3% | 25.5% | 25.1% |
| | 受診勧奨判定 300~ | 2,432 | 400 | 130 | 91 | 78 | 54 | 47 |
| (%) | 3.7% | 4.3% | 4.1% | 5.0% | 4.1% | 4.2% | 3.8% | |
| 不明・検査せず | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |
| HDLコレステロール | 異常なし 40~ | 62,725 | 8,759 | 2,937 | 1,681 | 1,775 | 1,214 | 1,152 |
| | (%) | 94.2% | 93.4% | 93.5% | 92.4% | 93.4% | 94.5% | 93.8% |
| | 保健指導判定 35~39 | 2,965 | 473 | 159 | 103 | 94 | 55 | 62 |
| | (%) | 4.5% | 5.0% | 5.1% | 5.7% | 4.9% | 4.3% | 5.0% |
| | 受診勧奨判定 ~34 | 905 | 138 | 45 | 35 | 32 | 13 | 13 |
| (%) | 1.4% | 1.5% | 1.4% | 1.9% | 1.7% | 1.0% | 1.1% | |
| 不明・検査せず | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | |
| LDLコレステロール | 異常なし ~119 | 35,968 | 5,240 | 1,778 | 1,015 | 1,099 | 633 | 715 |
| | (%) | 54.0% | 55.9% | 56.6% | 55.8% | 57.8% | 49.3% | 58.2% |
| | 保健指導判定 120~139 | 15,853 | 2,123 | 736 | 428 | 418 | 292 | 249 |
| | (%) | 23.8% | 22.7% | 23.4% | 23.5% | 22.0% | 22.7% | 20.3% |
| | 受診勧奨判定 140~ | 14,621 | 1,922 | 622 | 366 | 383 | 293 | 258 |
| (%) | 22.0% | 20.5% | 19.8% | 20.1% | 20.1% | 22.8% | 21.0% | |
| 不明・検査せず | 159 | 88 | 5 | 10 | 1 | 66 | 6 | |
| (%) | 0.2% | 0.9% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 5.1% | 0.5% | |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

5) 特定健康診査

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(令和2年度)

| | 石川県 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 受診者数 | 66,601 | 9,373 | 3,141 | 1,819 | 1,901 | 1,284 | 1,228 | |
| A S T (G O T) | 異常なし 8~30 | 57,438 | 8,057 | 2,716 | 1,565 | 1,646 | 1,077 | 1,053 |
| | (%) | 86.2% | 86.0% | 86.5% | 86.0% | 86.6% | 83.9% | 85.7% |
| | 保健指導判定 31~50 | 7,520 | 1,099 | 363 | 223 | 210 | 166 | 137 |
| | (%) | 11.3% | 11.7% | 11.6% | 12.3% | 11.0% | 12.9% | 11.2% |
| A L T (G P T) | 受診勧奨判定 51~ | 1,641 | 216 | 62 | 31 | 45 | 41 | 37 |
| | (%) | 2.5% | 2.3% | 2.0% | 1.7% | 2.4% | 3.2% | 3.0% |
| | 不明・検査せず | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| γ - G T P (G T P) | 異常なし ~50 | 56,307 | 7,983 | 2,695 | 1,571 | 1,589 | 1,080 | 1,048 |
| | (%) | 84.5% | 85.2% | 85.8% | 86.4% | 83.6% | 84.1% | 85.3% |
| | 保健指導判定 51~100 | 7,087 | 959 | 322 | 171 | 213 | 130 | 123 |
| | (%) | 10.6% | 10.2% | 10.3% | 9.4% | 11.2% | 10.1% | 10.0% |
| 血 糖 値 ・ ヘ モ グ ロ ビ ン A 1 c | 受診勧奨判定 101~ | 3,204 | 430 | 124 | 77 | 99 | 74 | 56 |
| | (%) | 4.8% | 4.6% | 3.9% | 4.2% | 5.2% | 5.8% | 4.6% |
| | 不明・検査せず | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 血 糖 値 ・ ヘ モ グ ロ ビ ン A 1 c | 異常なし 空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満 | 34,348 | 4,157 | 1,429 | 787 | 884 | 568 | 489 |
| | (%) | 51.6% | 44.4% | 45.5% | 43.3% | 46.5% | 44.2% | 39.8% |
| | 保健指導判定 空腹・随時血糖値100以上~ 126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満 | 25,409 | 4,134 | 1,371 | 825 | 802 | 546 | 590 |
| | (%) | 38.2% | 44.1% | 43.6% | 45.4% | 42.2% | 42.5% | 48.0% |
| 血 糖 値 ・ ヘ モ グ ロ ビ ン A 1 c | 受診勧奨判定 空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上 | 6,837 | 1,081 | 341 | 207 | 215 | 170 | 148 |
| | (%) | 10.3% | 11.5% | 10.9% | 11.4% | 11.3% | 13.2% | 12.1% |
| | 不明・検査せず | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

* 空腹時血糖があるものは空腹時血糖の値で判定、空腹時血糖が無くHbA1cがあるものはHbA1c、
空腹時血糖もHbA1cもないもので、随時血糖があるものは随時血糖で判定

5) 特定健康診査

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(令和2年度)

| | | 石川県 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 受診者数 | | 66,601 | 9,373 | 3,141 | 1,819 | 1,901 | 1,284 | 1,228 | |
| 尿検査 (蛋白) | (-) (±) | 62,696 | 8,846 | 2,975 | 1,726 | 1,800 | 1,188 | 1,157 | |
| | (%) | 94.1% | 94.4% | 94.7% | 94.9% | 94.7% | 92.5% | 94.2% | |
| | (+) 以上 | 3,794 | 501 | 160 | 88 | 98 | 90 | 65 | |
| | (%) | 5.7% | 5.3% | 5.1% | 4.8% | 5.2% | 7.0% | 5.3% | |
| 不明・検査せず | | 111 | 26 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | |
| (%) | | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | |
| 尿検査 (糖) | (-) (±) | 62,229 | 8,632 | 2,890 | 1,688 | 1,766 | 1,162 | 1,126 | |
| | (%) | 93.4% | 92.1% | 92.0% | 92.8% | 92.9% | 90.5% | 91.7% | |
| | (+) 以上 | 4,271 | 715 | 245 | 126 | 132 | 116 | 96 | |
| | (%) | 6.4% | 7.6% | 7.8% | 6.9% | 6.9% | 9.0% | 7.8% | |
| 不明・検査せず | | 101 | 26 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | |
| (%) | | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | |
| クレアチニン | 検査実施者数 | 64,567 | 9,256 | 3,123 | 1,773 | 1,888 | 1,257 | 1,215 | |
| | (%) | 96.9% | 98.8% | 99.4% | 97.5% | 99.3% | 97.9% | 98.9% | |
| | 異常なし 男性 ~1.2mg/dl 女性 ~1.0mg/dl | 63,365 | 9,085 | 3,081 | 1,736 | 1,847 | 1,226 | 1,195 | |
| | (%) | 98.1% | 98.2% | 98.7% | 97.9% | 97.8% | 97.5% | 98.4% | |
| | 要医療 男性 1.3mg/dl~ 女性 1.1mg/dl~ | 1,202 | 171 | 42 | 37 | 41 | 31 | 20 | |
| | (%) | 1.9% | 1.8% | 1.3% | 2.1% | 2.2% | 2.5% | 1.6% | |
| 推算糸球体濾過量 | 検査実施者数 | 64,627 | 9,256 | 3,123 | 1,773 | 1,888 | 1,257 | 1,215 | |
| | (%) | 97.0% | 98.8% | 99.4% | 97.5% | 99.3% | 97.9% | 98.9% | |
| | 1. ステージ | 60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白- | 46,577 | 6,693 | 2,294 | 1,278 | 1,351 | 871 | 899 |
| | | (%) | 72.1% | 72.3% | 73.5% | 72.1% | 71.6% | 69.3% | 74.0% |
| | ステージ3 | 50~60ml/min/1.73m ² 未満 | 11,695 | 1,695 | 554 | 324 | 363 | 247 | 207 |
| | | (%) | 18.1% | 18.3% | 17.7% | 18.3% | 19.2% | 19.6% | 17.0% |
| | | 40~50ml/min/1.73m ² 未満 | 3,175 | 444 | 145 | 88 | 92 | 70 | 49 |
| | | (%) | 4.9% | 4.8% | 4.6% | 5.0% | 4.9% | 5.6% | 4.0% |
| | 30~40ml/min/1.73m ² 未満 | 659 | 88 | 25 | 14 | 23 | 18 | 8 | |
| | | (%) | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 1.2% | 1.4% | 0.7% |
| | 4. ステージ | 30ml/min/1.73m ² 未満 | 271 | 41 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 |
| | | (%) | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| 60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+以上 | 2,250 | 295 | 96 | 59 | 50 | 45 | 45 | | |
| | (%) | 3.5% | 3.2% | 3.1% | 3.3% | 2.6% | 3.6% | 3.7% | |
| CKD該当者 | | 18,050 | 2,563 | 829 | 495 | 537 | 386 | 316 | |
| (%) | | 27.9% | 27.7% | 26.5% | 27.9% | 28.4% | 30.7% | 26.0% | |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

6) 特定健康診査 詳細項目

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(令和2年度)

| | 石川県 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 受診者数 | 66,601 | 9,373 | 3,141 | 1,819 | 1,901 | 1,284 | 1,228 | |
| 心電図 | 検査実施者数 | 56,140 | 8,418 | 3,049 | 1,570 | 1,839 | 872 | 1,088 |
| | (%) | 84.3% | 89.8% | 97.1% | 86.3% | 96.7% | 67.9% | 88.6% |
| | 所見なし | 39,673 | 5,848 | 2,286 | 1,011 | 1,311 | 494 | 746 |
| | (%) | 70.7% | 69.5% | 75.0% | 64.4% | 71.3% | 56.7% | 68.6% |
| | 所見あり | 16,467 | 2,570 | 763 | 559 | 528 | 378 | 342 |
| | (%) | 29.3% | 30.5% | 25.0% | 35.6% | 28.7% | 43.3% | 31.4% |
| 貧血判定 (ヘモグロビン値) | 検査実施者数 | 56,280 | 8,430 | 3,051 | 1,570 | 1,842 | 872 | 1,095 |
| | (%) | 84.5% | 89.9% | 97.1% | 86.3% | 96.9% | 67.9% | 89.2% |
| | 異常なし 男性:13≦ 女性:12≦ | 50,642 | 7,509 | 2,717 | 1,405 | 1,609 | 803 | 975 |
| | (%) | 90.0% | 89.1% | 89.1% | 89.5% | 87.4% | 92.1% | 89.0% |
| | 保健指導判定 男性:12以上13未満 女性:11以上12未満 | 4,265 | 714 | 261 | 130 | 182 | 50 | 91 |
| | (%) | 7.6% | 8.5% | 8.6% | 8.3% | 9.9% | 5.7% | 8.3% |
| 受診勧奨判定 男性:<12 女性:<11 | 1,373 | 207 | 73 | 35 | 51 | 19 | 29 | |
| | (%) | 2.4% | 2.5% | 2.4% | 2.2% | 2.8% | 2.2% | 2.6% |
| 眼底検査 | 検査実施者数 | 7,752 | 1,433 | 617 | 152 | 266 | 179 | 219 |
| | (%) | 11.6% | 15.3% | 19.6% | 8.4% | 14.0% | 13.9% | 17.8% |
| | 異常なし | 7,541 | 1,405 | 604 | 151 | 257 | 178 | 215 |
| | (%) | 97.3% | 98.0% | 97.9% | 99.3% | 96.6% | 99.4% | 98.2% |
| | 要指導 | 119 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | (%) | 1.5% | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
| 要医療 | 92 | 24 | 11 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| (%) | 1.2% | 1.7% | 1.8% | 0.0% | 3.4% | 0.6% | 1.4% | |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

7) 喫煙状況

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(令和2年度)

| | 石川県 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 受診者数 | 66,601 | 9,373 | 3,141 | 1,819 | 1,901 | 1,284 | 1,228 | |
| 習慣的な喫煙 | 吸っている | 8,241 | 1,123 | 366 | 231 | 245 | 162 | 119 |
| | (%) | 12.4% | 12.0% | 11.7% | 12.7% | 12.9% | 12.6% | 9.7% |
| | 吸っていない | 58,385 | 8,250 | 2,775 | 1,588 | 1,656 | 1,122 | 1,109 |
| | (%) | 87.7% | 88.0% | 88.3% | 87.3% | 87.1% | 87.4% | 90.3% |
| | 不明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

8) 特定保健指導(積極的支援)の3ヵ月後の評価

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(令和2年度)

| | 石川県 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|---------|-------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 評価実施者数 | 398 | 108 | 50 | 28 | 17 | 3 | 10 | |
| 体重減少 | 5%Kg以上減少 | 47 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| | (%) | 11.8% | 7.4% | 4.0% | 14.3% | 5.9% | 33.3% | 0.0% |
| | 5%Kg以上の減少なし | 350 | 100 | 48 | 24 | 16 | 2 | 10 |
| | (%) | 87.9% | 92.6% | 96.0% | 85.7% | 94.1% | 66.7% | 100.0% |
| | 測定なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (%) | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 腹囲減少 | 3cm以上減少 | 75 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| | (%) | 18.8% | 13.0% | 14.0% | 21.4% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
| | 3cm以上の減少なし | 323 | 94 | 43 | 22 | 17 | 2 | 10 |
| | (%) | 81.2% | 87.0% | 86.0% | 78.6% | 100.0% | 66.7% | 100.0% |
| | 測定なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 栄養・食生活 | 変化なし | 169 | 56 | 29 | 7 | 14 | 1 | 5 |
| | (%) | 42.5% | 51.9% | 58.0% | 25.0% | 82.4% | 33.3% | 50.0% |
| | 改善 | 216 | 51 | 21 | 20 | 3 | 2 | 5 |
| | (%) | 54.3% | 47.2% | 42.0% | 71.4% | 17.6% | 66.7% | 50.0% |
| | 悪化 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | (%) | 3.3% | 0.9% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 身体活動 | 変化なし | 259 | 77 | 41 | 13 | 14 | 2 | 7 |
| | (%) | 65.1% | 71.3% | 82.0% | 46.4% | 82.4% | 66.7% | 70.0% |
| | 改善 | 133 | 30 | 9 | 14 | 3 | 1 | 3 |
| | (%) | 33.4% | 27.8% | 18.0% | 50.0% | 17.6% | 33.3% | 30.0% |
| | 悪化 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | (%) | 1.5% | 0.9% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 喫煙 | 評価実施者数 | 124 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | 健診時は喫煙の者 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | (%) | 14.5% | 17.6% | 25.0% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 非継続 | 23 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | (%) | 18.5% | 70.6% | 25.0% | 84.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 禁煙の意思なし | 83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (%) | 66.9% | 11.8% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 評価実施者数 | 144 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | 健診時は非喫煙の者 | 129 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | (%) | 89.6% | 40.0% | 100.0% | 35.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 非継続 | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| | (%) | 9.0% | 60.0% | 0.0% | 64.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 禁煙の意思なし | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (%) | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

9) 特定保健指導(動機付け支援)の3ヵ月後の評価

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(令和2年度)

| | | 石川県 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----------|-------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 評価実施者数 | | 2,400 | 532 | 188 | 123 | 85 | 91 | 45 |
| 体重減少 | 5%Kg以上減少 | 134 | 18 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| | (%) | 5.6% | 3.4% | 2.7% | 5.7% | 3.5% | 1.1% | 4.4% |
| | 5%Kg以上の減少なし | 2,264 | 514 | 183 | 116 | 82 | 90 | 43 |
| | (%) | 94.3% | 96.6% | 97.3% | 94.3% | 96.5% | 98.9% | 95.6% |
| 腹囲減少 | 3cm以上減少 | 349 | 45 | 14 | 14 | 4 | 8 | 5 |
| | (%) | 14.5% | 8.5% | 7.4% | 11.4% | 4.7% | 8.8% | 11.1% |
| | 3cm以上の減少なし | 2,050 | 487 | 174 | 109 | 81 | 83 | 40 |
| | (%) | 85.4% | 91.5% | 92.6% | 88.6% | 95.3% | 91.2% | 88.9% |
| 栄養・食生活 | 変化なし | 1,390 | 341 | 124 | 51 | 67 | 63 | 36 |
| | (%) | 57.9% | 64.1% | 66.0% | 41.5% | 78.8% | 69.2% | 80.0% |
| | 改善 | 972 | 184 | 62 | 69 | 17 | 28 | 8 |
| | (%) | 40.5% | 34.6% | 33.0% | 56.1% | 20.0% | 30.8% | 17.8% |
| 身体活動 | 悪化 | 38 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| | (%) | 1.6% | 1.3% | 1.1% | 2.4% | 1.2% | 0.0% | 2.2% |
| | 変化なし | 1,504 | 388 | 153 | 63 | 72 | 64 | 36 |
| | (%) | 62.7% | 72.9% | 81.4% | 51.2% | 84.7% | 70.3% | 80.0% |
| 喫煙 | 改善 | 805 | 137 | 34 | 58 | 10 | 27 | 8 |
| | (%) | 33.5% | 25.8% | 18.1% | 47.2% | 11.8% | 29.7% | 17.8% |
| | 悪化 | 91 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| | (%) | 3.8% | 1.3% | 0.5% | 1.6% | 3.5% | 0.0% | 2.2% |
| 健診時は喫煙の者 | 評価実施者数 | 185 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 禁煙継続 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | (%) | 22.2% | 12.5% | 16.7% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 非継続 | 29 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 健診時は非喫煙の者 | (%) | 15.7% | 56.3% | 0.0% | 90.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 禁煙の意思なし | 115 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (%) | 62.2% | 31.3% | 83.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 評価実施者数 | 1,319 | 96 | 12 | 82 | 0 | 2 | 0 |
| 非喫煙 | 1,247 | 51 | 12 | 37 | 0 | 2 | 0 | |
| (%) | 94.5% | 53.1% | 100.0% | 45.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
| 非継続 | 61 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| (%) | 4.6% | 46.9% | 0.0% | 54.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 禁煙の意思なし | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (%) | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より


10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(1) 特定健康診査の対象者数・受診者数・受診率

| 対象者 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 七尾市 | 9,633 | 9,213 | 8,926 | 8,773 | 8,633 |
| 羽咋市 | 4,245 | 4,074 | 3,883 | 3,744 | 3,663 |
| 志賀町 | 4,231 | 4,087 | 3,946 | 3,810 | 3,771 |
| 宝達志水町 | 2,341 | 2,256 | 2,213 | 2,171 | 2,142 |
| 中能登町 | 3,226 | 3,094 | 2,977 | 2,884 | 2,849 |
| 管内 | 23,676 | 22,724 | 21,945 | 21,382 | 21,058 |
| 石川県 | 179,102 | 172,774 | 166,049 | 161,690 | 160,547 |

| 受診者 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 七尾市 | 4,484 | 4,204 | 4,011 | 3,740 | 3,065 |
| (%) | 46.5% | 45.6% | 44.9% | 42.6% | 35.5% |
| 羽咋市 | 2,107 | 2,107 | 2,054 | 2,026 | 1,738 |
| (%) | 49.6% | 51.7% | 52.9% | 54.1% | 47.4% |
| 志賀町 | 2,445 | 2,310 | 2,152 | 2,113 | 1,861 |
| (%) | 57.8% | 56.5% | 54.5% | 55.5% | 49.4% |
| 宝達志水町 | 1,393 | 1,343 | 1,318 | 1,303 | 1,243 |
| (%) | 59.5% | 59.5% | 59.6% | 60.0% | 58.0% |
| 中能登町 | 1,615 | 1,600 | 1,519 | 1,408 | 1,203 |
| (%) | 50.1% | 51.7% | 51.0% | 48.8% | 42.2% |
| 管内 | 12,044 | 11,564 | 11,054 | 10,590 | 9,110 |
| (%) | 50.9% | 50.9% | 50.4% | 49.5% | 43.3% |
| 石川県 | 80,701 | 78,819 | 76,571 | 76,053 | 64,492 |
| (%) | 45.1% | 45.6% | 46.1% | 47.0% | 40.2% |




10) 経年推移

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(2) 特定保健指導の対象者数・終了者数・実施率

| 対象者 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 七尾市 | 511 | 492 | 437 | 416 | 338 |
| 羽咋市 | 236 | 279 | 249 | 257 | 198 |
| 志賀町 | 238 | 240 | 230 | 203 | 162 |
| 宝達志水町 | 156 | 150 | 135 | 156 | 141 |
| 中能登町 | 209 | 207 | 194 | 186 | 150 |
| 管内 | 1,350 | 1,368 | 1,245 | 1,218 | 989 |
| 石川県 | 8,323 | 8,154 | 7,886 | 7,645 | 6,496 |

| 終了者数 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 七尾市 | 372 | 369 | 319 | 314 | 292 |
| (%) | 72.8% | 75.0% | 73.0% | 75.5% | 86.4% |
| 羽咋市 | 193 | 226 | 223 | 223 | 172 |
| (%) | 81.8% | 81.0% | 89.6% | 86.8% | 86.9% |
| 志賀町 | 164 | 174 | 140 | 127 | 102 |
| (%) | 68.9% | 72.5% | 60.9% | 62.6% | 63.0% |
| 宝達志水町 | 128 | 109 | 84 | 114 | 94 |
| (%) | 82.1% | 72.7% | 62.2% | 73.1% | 66.7% |
| 中能登町 | 131 | 134 | 134 | 136 | 83 |
| (%) | 62.7% | 64.7% | 69.1% | 73.1% | 55.3% |
| 管内 | 988 | 1,012 | 900 | 914 | 743 |
| (%) | 73.2% | 74.0% | 72.3% | 75.0% | 75.1% |
| 石川県 | 4,728 | 4,628 | 4,560 | 4,230 | 3,032 |
| (%) | 56.8% | 56.8% | 57.8% | 55.3% | 46.7% |




10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(3) 結果－内臓脂肪症候群－

| | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 七尾市 | 内臓脂肪症候群 | 951 21.2% | 927 22.1% | 890 22.1% | 850 22.7% | 805 26.3% |
| | 内臓脂肪症候群予備群 | 460 10.3% | 456 10.8% | 442 11.0% | 392 10.5% | 293 9.6% |
| 羽咋市 | 内臓脂肪症候群 | 426 20.2% | 468 22.2% | 478 23.3% | 484 23.9% | 433 24.9% |
| | 内臓脂肪症候群予備群 | 196 9.3% | 230 10.9% | 213 10.4% | 206 10.2% | 161 9.3% |
| 志賀町 | 内臓脂肪症候群 | 521 21.3% | 567 24.2% | 497 23.1% | 543 25.7% | 486 26.1% |
| | 内臓脂肪症候群予備群 | 280 11.4% | 257 11.0% | 251 11.7% | 219 10.4% | 197 10.6% |
| 宝達志水町 | 内臓脂肪症候群 | 316 22.7% | 308 22.9% | 312 23.7% | 332 25.4% | 364 29.2% |
| | 内臓脂肪症候群予備群 | 156 11.2% | 149 11.1% | 144 10.9% | 162 12.4% | 150 12.0% |
| 中能登町 | 内臓脂肪症候群 | 354 21.9% | 370 23.1% | 329 21.7% | 332 23.6% | 316 26.3% |
| | 内臓脂肪症候群予備群 | 168 10.4% | 152 9.5% | 154 10.1% | 130 9.2% | 120 10.0% |
| 管内 | 内臓脂肪症候群 | 2,568 21.3% | 2,640 22.8% | 2,506 22.7% | 2,541 24.0% | 2,404 26.4% |
| | 内臓脂肪症候群予備群 | 1,260 10.5% | 1,244 10.7% | 1,204 10.9% | 1,109 10.5% | 921 10.1% |
| 石川県 | 内臓脂肪症候群 | 15,799 19.6% | 15,896 20.2% | 15,847 20.7% | 16,518 21.7% | 15,629 24.2% |
| | 内臓脂肪症候群予備群 | 8,267 10.2% | 8,114 10.3% | 8,016 10.5% | 8,096 10.6% | 6,910 10.7% |

内臓脂肪症候群の割合の年次推移



10) 経年推移

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(4) 結果－腹囲、BMI－

| | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|-------|-----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 七尾市 | 腹囲 | 男性:85cm以上 | 1,894 | 1,798 | 1,740 | 1,638 | 1,394 |
| | | 女性:90cm以上 またはBMI25以上 | 40.7% | 41.7% | 42.1% | 42.7% | 44.4% |
| | 腹囲 | 男性:85cm未満 | 3,039 | 2,775 | 2,641 | 2,450 | 1,933 |
| | | 女性:90cm未満 | 65.3% | 64.4% | 63.9% | 63.9% | 61.5% |
| | | 男性:85cm以上 | 1,604 | 1,535 | 1,488 | 1,380 | 1,208 |
| | | 女性:90cm以上 | 34.5% | 35.6% | 36.0% | 36.0% | 38.5% |
| | | 実施せず | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| | BMI | 18.5未満 | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| | | 18.5～25未満 | 257 | 249 | 207 | 207 | 165 |
| | | 25以上 | 5.5% | 5.8% | 5.0% | 5.4% | 5.3% |
| 25以上 | | 3,043 | 2,752 | 2,683 | 2,446 | 1,982 | |
| 実施せず | | 65.4% | 63.8% | 64.9% | 63.8% | 63.1% | |
| 羽咋市 | 腹囲 | 男性:85cm以上 | 843 | 891 | 888 | 885 | 762 |
| | | 女性:90cm以上 またはBMI25以上 | 38.8% | 41.3% | 41.6% | 42.3% | 41.9% |
| | 腹囲 | 男性:85cm未満 | 1,448 | 1,376 | 1,347 | 1,302 | 1,151 |
| | | 女性:90cm未満 | 66.6% | 63.7% | 63.0% | 62.2% | 63.3% |
| | | 男性:85cm以上 | 725 | 784 | 790 | 792 | 668 |
| | | 女性:90cm以上 | 33.4% | 36.3% | 37.0% | 37.8% | 36.7% |
| | | 実施せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BMI | 18.5未満 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | 18.5～25未満 | 140 | 138 | 142 | 131 | 126 |
| | | 25以上 | 6.4% | 6.4% | 6.6% | 6.3% | 6.9% |
| 25以上 | | 1,475 | 1,427 | 1,453 | 1,403 | 1,195 | |
| 実施せず | | 67.9% | 66.1% | 68.0% | 67.0% | 65.7% | |
| 志賀町 | 腹囲 | 男性:85cm以上 | 1,067 | 1,052 | 956 | 954 | 859 |
| | | 女性:90cm以上 またはBMI25以上 | 42.2% | 43.3% | 43.2% | 44.0% | 45.2% |
| | 腹囲 | 男性:85cm未満 | 1,619 | 1,499 | 1,384 | 1,344 | 1,155 |
| | | 女性:90cm未満 | 64.0% | 61.7% | 62.6% | 61.9% | 60.8% |
| | | 男性:85cm以上 | 906 | 916 | 827 | 826 | 746 |
| | | 女性:90cm以上 | 35.8% | 37.7% | 37.4% | 38.1% | 39.2% |
| | | 実施せず | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | BMI | 18.5未満 | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | 18.5～25未満 | 127 | 114 | 102 | 116 | 93 |
| | | 25以上 | 5.0% | 4.7% | 4.6% | 5.3% | 4.9% |
| 25以上 | | 1,620 | 1,549 | 1,412 | 1,344 | 1,180 | |
| 実施せず | | 64.0% | 63.8% | 63.9% | 61.9% | 62.1% | |
| 宝達志水町 | 腹囲 | 男性:85cm以上 | 620 | 586 | 578 | 618 | 625 |
| | | 女性:90cm以上 またはBMI25以上 | 43.1% | 42.6% | 43.2% | 47.1% | 48.7% |
| | 腹囲 | 男性:85cm未満 | 888 | 857 | 818 | 763 | 718 |
| | | 女性:90cm未満 | 61.7% | 62.2% | 61.1% | 58.1% | 55.9% |
| | | 男性:85cm以上 | 550 | 520 | 519 | 548 | 566 |
| | | 女性:90cm以上 | 38.2% | 37.8% | 38.8% | 41.7% | 44.1% |
| | | 実施せず | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | BMI | 18.5未満 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
| | | 18.5～25未満 | 83 | 81 | 76 | 82 | 69 |
| | | 25以上 | 5.8% | 5.9% | 5.7% | 6.2% | 5.4% |
| 25以上 | | 961 | 923 | 892 | 831 | 817 | |
| 実施せず | | 66.8% | 67.0% | 66.7% | 63.3% | 63.6% | |
| 中能登町 | 腹囲 | 男性:85cm以上 | 671 | 663 | 632 | 616 | 559 |
| | | 女性:90cm以上 またはBMI25以上 | 40.4% | 40.3% | 40.3% | 42.4% | 45.5% |
| | 腹囲 | 男性:85cm未満 | 1,076 | 1,063 | 1,029 | 929 | 749 |
| | | 女性:90cm未満 | 64.8% | 64.5% | 65.6% | 64.0% | 61.0% |
| | | 男性:85cm以上 | 584 | 584 | 539 | 523 | 479 |
| | | 女性:90cm以上 | 35.2% | 35.5% | 34.4% | 36.0% | 39.0% |
| | | 実施せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BMI | 18.5未満 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | 18.5～25未満 | 78 | 78 | 76 | 85 | 75 |
| | | 25以上 | 4.7% | 4.7% | 4.8% | 5.9% | 6.1% |
| 25以上 | | 1,117 | 1,107 | 1,024 | 918 | 746 | |
| 実施せず | | 67.3% | 67.2% | 65.3% | 63.2% | 60.7% | |
| 管内 | 腹囲 | 男性:85cm以上 | 5,095 | 4,990 | 4,794 | 4,711 | 4,199 |
| | | 女性:90cm以上 またはBMI25以上 | 40.9% | 41.9% | 42.1% | 43.4% | 44.8% |
| | 腹囲 | 男性:85cm未満 | 8,070 | 7,570 | 7,219 | 6,788 | 5,706 |
| | | 女性:90cm未満 | 64.8% | 63.5% | 63.4% | 62.5% | 60.9% |
| | | 男性:85cm以上 | 4,369 | 4,339 | 4,163 | 4,069 | 3,667 |
| | | 女性:90cm以上 | 35.1% | 36.4% | 36.6% | 37.5% | 39.1% |
| | | 実施せず | 15 | 14 | 6 | 5 | 0 |
| | BMI | 18.5未満 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| | | 18.5～25未満 | 685 | 660 | 603 | 621 | 528 |
| | | 25以上 | 5.5% | 5.5% | 5.3% | 5.7% | 5.6% |
| 25以上 | | 8,216 | 7,758 | 7,464 | 6,942 | 5,920 | |
| 実施せず | | 66.0% | 65.1% | 65.5% | 63.9% | 63.2% | |
| 石川県 | 腹囲 | 男性:85cm以上 | 31,569 | 31,041 | 30,192 | 31,505 | 28,194 |
| | | 女性:90cm以上 またはBMI25以上 | 37.7% | 38.1% | 38.1% | 40.2% | 42.3% |
| | 腹囲 | 男性:85cm未満 | 56,124 | 54,127 | 52,993 | 50,496 | 41,406 |
| | | 女性:90cm未満 | 67.0% | 66.5% | 66.8% | 64.4% | 62.2% |
| | | 男性:85cm以上 | 27,643 | 27,251 | 26,268 | 27,925 | 25,192 |
| | | 女性:90cm以上 | 33.0% | 33.5% | 33.1% | 35.6% | 37.8% |
| | | 実施せず | 23 | 19 | 16 | 19 | 3 |
| | BMI | 18.5未満 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | 18.5～25未満 | 5,890 | 5,641 | 5,612 | 5,624 | 4,597 |
| | | 25以上 | 7.0% | 6.9% | 7.1% | 7.2% | 6.9% |
| 25以上 | | 56,981 | 54,989 | 53,097 | 51,845 | 43,327 | |
| 実施せず | | 68.0% | 67.6% | 67.0% | 66.1% | 65.1% | |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(5) 結果－血圧－

| | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 七尾市 | 異常なし | 2,460 | 2,222 | 2,129 | 1,999 | 1,404 |
| | ～129and～84 | 52.9% | 51.5% | 51.5% | 52.2% | 44.7% |
| | 保健指導判定 | 947 | 946 | 937 | 891 | 808 |
| | 130～139or85～89 | 20.4% | 21.9% | 22.7% | 23.2% | 25.7% |
| | 受診勧奨判定 | 1,242 | 1,142 | 1,064 | 941 | 929 |
| | 140～or90～ | 26.7% | 26.5% | 25.7% | 24.5% | 29.6% |
| 不明・検査せず | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| | | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 羽咋市 | 異常なし | 1,205 | 1,148 | 1,168 | 1,134 | 921 |
| | ～129and～84 | 55.5% | 53.1% | 54.7% | 54.2% | 50.6% |
| | 保健指導判定 | 488 | 519 | 532 | 504 | 479 |
| | 130～139or85～89 | 22.5% | 24.0% | 24.9% | 24.1% | 26.3% |
| | 受診勧奨判定 | 480 | 493 | 437 | 456 | 419 |
| | 140～or90～ | 22.1% | 22.8% | 20.4% | 21.8% | 23.0% |
| 不明・検査せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 志賀町 | 異常なし | 1,251 | 1,163 | 1,100 | 1,060 | 882 |
| | ～129and～84 | 49.4% | 47.9% | 49.8% | 48.8% | 46.4% |
| | 保健指導判定 | 603 | 559 | 495 | 488 | 456 |
| | 130～139or85～89 | 23.8% | 23.0% | 22.4% | 22.5% | 24.0% |
| | 受診勧奨判定 | 671 | 693 | 616 | 622 | 563 |
| | 140～or90～ | 26.5% | 28.5% | 27.9% | 28.7% | 29.6% |
| 不明・検査せず | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 宝達志水町 | 異常なし | 789 | 770 | 766 | 758 | 614 |
| | ～129and～84 | 54.8% | 55.9% | 57.2% | 57.7% | 47.8% |
| | 保健指導判定 | 320 | 314 | 289 | 278 | 342 |
| | 130～139or85～89 | 22.2% | 22.8% | 21.6% | 21.2% | 26.6% |
| | 受診勧奨判定 | 330 | 293 | 283 | 277 | 328 |
| | 140～or90～ | 22.9% | 21.3% | 21.2% | 21.1% | 25.5% |
| 不明・検査せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 中能登町 | 異常なし | 774 | 774 | 732 | 687 | 528 |
| | ～129and～84 | 46.6% | 47.0% | 46.7% | 47.3% | 43.0% |
| | 保健指導判定 | 358 | 364 | 346 | 340 | 314 |
| | 130～139or85～89 | 21.6% | 22.1% | 22.1% | 23.4% | 25.6% |
| | 受診勧奨判定 | 528 | 509 | 490 | 425 | 385 |
| | 140～or90～ | 31.8% | 30.9% | 31.3% | 29.3% | 31.4% |
| 不明・検査せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 管内 | 異常なし | 6,479 | 6,077 | 5,895 | 5,638 | 4,349 |
| | ～129and～84 | 52.0% | 51.0% | 51.8% | 51.9% | 46.4% |
| | 保健指導判定 | 2,716 | 2,702 | 2,599 | 2,501 | 2,399 |
| | 130～139or85～89 | 21.8% | 22.7% | 22.8% | 23.0% | 25.6% |
| | 受診勧奨判定 | 3,251 | 3,130 | 2,890 | 2,721 | 2,624 |
| | 140～or90～ | 26.1% | 26.3% | 25.4% | 25.1% | 28.0% |
| 不明・検査せず | 8 | 14 | 4 | 2 | 1 | |
| | | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 異常なし | 45,394 | 43,411 | 42,473 | 42,189 | 32,506 |
| | ～129and～84 | 54.2% | 53.3% | 53.6% | 53.8% | 48.8% |
| | 保健指導判定 | 18,828 | 18,502 | 18,057 | 17,971 | 16,410 |
| | 130～139or85～89 | 22.5% | 22.7% | 22.8% | 22.9% | 24.6% |
| | 受診勧奨判定 | 19,560 | 19,470 | 18,741 | 18,272 | 17,682 |
| | 140～or90～ | 23.3% | 23.9% | 23.6% | 23.3% | 26.5% |
| 不明・検査せず | 8 | 14 | 6 | 8 | 3 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(6) 結果－中性脂肪－

| | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 七尾市 | 異常なし | 3,485 | 3,192 | 3,073 | 2,813 | 2,223 |
| | ～149 | 74.9% | 74.0% | 74.3% | 73.4% | 70.8% |
| | 保健指導判定 | 1,019 | 976 | 927 | 887 | 788 |
| | 150～299 | 21.9% | 22.6% | 22.4% | 23.1% | 25.1% |
| | 受診勧奨判定 | 147 | 143 | 130 | 132 | 130 |
| 300～ | 3.2% | 3.3% | 3.1% | 3.4% | 4.1% | |
| 不明・検査せず | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 羽咋市 | 異常なし | 1,559 | 1,526 | 1,506 | 1,525 | 1,239 |
| | ～149 | 71.7% | 70.6% | 70.5% | 72.8% | 68.1% |
| | 保健指導判定 | 538 | 547 | 537 | 490 | 489 |
| | 150～299 | 24.8% | 25.3% | 25.1% | 23.4% | 26.9% |
| | 受診勧奨判定 | 76 | 87 | 94 | 79 | 91 |
| 300～ | 3.5% | 4.0% | 4.4% | 3.8% | 5.0% | |
| 不明・検査せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 志賀町 | 異常なし | 1,963 | 1,821 | 1,694 | 1,601 | 1,380 |
| | ～149 | 77.6% | 75.0% | 76.6% | 73.8% | 72.6% |
| | 保健指導判定 | 498 | 536 | 441 | 497 | 443 |
| | 150～299 | 19.7% | 22.1% | 19.9% | 22.9% | 23.3% |
| | 受診勧奨判定 | 64 | 68 | 76 | 72 | 78 |
| 300～ | 2.5% | 2.8% | 3.4% | 3.3% | 4.1% | |
| 不明・検査せず | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 宝達志水町 | 異常なし | 1,123 | 1,030 | 977 | 977 | 902 |
| | ～149 | 78.0% | 74.8% | 73.0% | 74.4% | 70.2% |
| | 保健指導判定 | 273 | 303 | 319 | 299 | 328 |
| | 150～299 | 19.0% | 22.0% | 23.8% | 22.8% | 25.5% |
| | 受診勧奨判定 | 43 | 44 | 42 | 37 | 54 |
| 300～ | 3.0% | 3.2% | 3.1% | 2.8% | 4.2% | |
| 不明・検査せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中能登町 | 異常なし | 1,244 | 1,182 | 1,155 | 1,058 | 872 |
| | ～149 | 74.9% | 71.8% | 73.7% | 72.9% | 71.0% |
| | 保健指導判定 | 368 | 406 | 352 | 348 | 308 |
| | 150～299 | 22.2% | 24.7% | 22.4% | 24.0% | 25.1% |
| | 受診勧奨判定 | 47 | 58 | 60 | 45 | 47 |
| 300～ | 2.8% | 3.5% | 3.8% | 3.1% | 3.8% | |
| 不明・検査せず | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 管内 | 異常なし | 9,374 | 8,751 | 8,405 | 7,974 | 6,616 |
| | ～149 | 75.3% | 73.4% | 73.8% | 73.4% | 70.6% |
| | 保健指導判定 | 2,696 | 2,768 | 2,576 | 2,521 | 2,356 |
| | 150～299 | 21.6% | 23.2% | 22.6% | 23.2% | 25.1% |
| | 受診勧奨判定 | 377 | 400 | 402 | 365 | 400 |
| 300～ | 3.0% | 3.4% | 3.5% | 3.4% | 4.3% | |
| 不明・検査せず | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
| | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 石川県 | 異常なし | 64,002 | 61,679 | 60,421 | 59,631 | 49,010 |
| | ～149 | 76.4% | 75.8% | 76.2% | 76.0% | 73.6% |
| | 保健指導判定 | 17,253 | 17,194 | 16,426 | 16,357 | 15,155 |
| | 150～299 | 20.6% | 21.1% | 20.7% | 20.9% | 22.8% |
| | 受診勧奨判定 | 2,527 | 2,519 | 2,425 | 2,447 | 2,432 |
| 300～ | 3.0% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.7% | |
| 不明・検査せず | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

(7) 結果－HDLコレステロール－

| | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 七尾市 | 異常なし | 4,333 | 4,019 | 3,878 | 3,613 | 2,937 |
| | 40～ | 93.1% | 93.2% | 93.8% | 94.3% | 93.5% |
| | 保健指導判定 | 249 | 231 | 184 | 177 | 159 |
| | 35～39 | 5.4% | 5.4% | 4.5% | 4.6% | 5.1% |
| | 受診勧奨判定 | 69 | 61 | 65 | 42 | 45 |
| ～34 | 1.5% | 1.4% | 1.6% | 1.1% | 1.4% | |
| 不明・検査せず | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 羽咋市 | 異常なし | 1,980 | 1,990 | 1,989 | 1,902 | 1,681 |
| | 40～ | 91.1% | 92.1% | 93.1% | 90.8% | 92.4% |
| | 保健指導判定 | 146 | 129 | 110 | 140 | 103 |
| | 35～39 | 6.7% | 6.0% | 5.1% | 6.7% | 5.7% |
| | 受診勧奨判定 | 47 | 41 | 38 | 52 | 35 |
| ～34 | 2.2% | 1.9% | 1.8% | 2.5% | 1.9% | |
| 不明・検査せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 志賀町 | 異常なし | 2,354 | 2,267 | 2,093 | 2,055 | 1,775 |
| | 40～ | 93.0% | 93.4% | 94.7% | 94.7% | 93.4% |
| | 保健指導判定 | 123 | 114 | 94 | 83 | 94 |
| | 35～39 | 4.9% | 4.7% | 4.3% | 3.8% | 4.9% |
| | 受診勧奨判定 | 45 | 41 | 24 | 32 | 32 |
| ～34 | 1.8% | 1.7% | 1.1% | 1.5% | 1.7% | |
| 不明・検査せず | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 宝達志水町 | 異常なし | 1,339 | 1,304 | 1,272 | 1,195 | 1,214 |
| | 40～ | 93.1% | 94.7% | 95.1% | 91.0% | 94.5% |
| | 保健指導判定 | 73 | 60 | 54 | 83 | 55 |
| | 35～39 | 5.1% | 4.4% | 4.0% | 6.3% | 4.3% |
| | 受診勧奨判定 | 27 | 13 | 12 | 33 | 13 |
| ～34 | 1.9% | 0.9% | 0.9% | 2.5% | 1.0% | |
| 不明・検査せず | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
| 中能登町 | 異常なし | 1,535 | 1,525 | 1,461 | 1,369 | 1,152 |
| | 40～ | 92.5% | 92.6% | 93.2% | 94.3% | 93.8% |
| | 保健指導判定 | 99 | 92 | 80 | 65 | 62 |
| | 35～39 | 6.0% | 5.6% | 5.1% | 4.5% | 5.0% |
| | 受診勧奨判定 | 25 | 29 | 26 | 17 | 13 |
| ～34 | 1.5% | 1.8% | 1.7% | 1.2% | 1.1% | |
| 不明・検査せず | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 管内 | 異常なし | 11,541 | 11,105 | 10,693 | 10,134 | 8,759 |
| | 40～ | 92.7% | 93.1% | 93.9% | 93.3% | 93.4% |
| | 保健指導判定 | 690 | 626 | 522 | 548 | 473 |
| | 35～39 | 5.5% | 5.3% | 4.6% | 5.0% | 5.0% |
| | 受診勧奨判定 | 213 | 185 | 165 | 176 | 138 |
| ～34 | 1.7% | 1.6% | 1.4% | 1.6% | 1.5% | |
| 不明・検査せず | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | |
| | | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 異常なし | 78,454 | 76,643 | 74,946 | 74,147 | 62,725 |
| | 40～ | 93.6% | 94.2% | 94.5% | 94.5% | 94.2% |
| | 保健指導判定 | 4,038 | 3,632 | 3,307 | 3,277 | 2,965 |
| | 35～39 | 4.8% | 4.5% | 4.2% | 4.2% | 4.5% |
| | 受診勧奨判定 | 1,287 | 1,115 | 1,016 | 1,005 | 905 |
| ～34 | 1.5% | 1.4% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | |
| 不明・検査せず | 11 | 7 | 8 | 11 | 6 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

(8) 結果－LDLコレステロール－

| | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 七尾市 | 異常なし | 2,618 | 2,526 | 2,331 | 2,134 | 1,778 |
| | ～119 | 56.3% | 58.6% | 56.4% | 55.7% | 56.6% |
| | 保健指導判定 | 1,042 | 915 | 958 | 904 | 736 |
| | 120～139 | 22.4% | 21.2% | 23.2% | 23.6% | 23.4% |
| | 受診勧奨判定 | 992 | 870 | 833 | 785 | 622 |
| 140～ | 21.3% | 20.2% | 20.1% | 20.5% | 19.8% | |
| 不明・検査せず | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 羽咋市 | 異常なし | 1,186 | 1,266 | 1,198 | 1,219 | 1,015 |
| | ～119 | 54.6% | 58.6% | 56.1% | 58.2% | 55.8% |
| | 保健指導判定 | 540 | 472 | 468 | 459 | 428 |
| | 120～139 | 24.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 23.5% |
| | 受診勧奨判定 | 447 | 422 | 471 | 416 | 366 |
| 140～ | 20.6% | 19.5% | 22.0% | 19.9% | 20.1% | |
| 不明・検査せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
| 志賀町 | 異常なし | 1,395 | 1,422 | 1,238 | 1,183 | 1,099 |
| | ～119 | 55.1% | 58.6% | 56.0% | 54.5% | 57.8% |
| | 保健指導判定 | 619 | 560 | 525 | 511 | 418 |
| | 120～139 | 24.5% | 23.1% | 23.7% | 23.5% | 22.0% |
| | 受診勧奨判定 | 508 | 439 | 448 | 473 | 383 |
| 140～ | 20.1% | 18.1% | 20.3% | 21.8% | 20.1% | |
| 不明・検査せず | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | |
| | | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| 宝達志水町 | 異常なし | 770 | 748 | 658 | 724 | 633 |
| | ～119 | 53.5% | 54.3% | 49.2% | 55.1% | 49.3% |
| | 保健指導判定 | 355 | 338 | 311 | 289 | 292 |
| | 120～139 | 24.7% | 24.5% | 23.2% | 22.0% | 22.7% |
| | 受診勧奨判定 | 314 | 289 | 347 | 255 | 293 |
| 140～ | 21.8% | 21.0% | 25.9% | 19.4% | 22.8% | |
| 不明・検査せず | 0 | 2 | 22 | 45 | 66 | |
| | | 0.0% | 0.1% | 1.6% | 3.4% | 5.1% |
| 中能登町 | 異常なし | 923 | 940 | 859 | 799 | 715 |
| | ～119 | 55.6% | 57.1% | 54.8% | 55.0% | 58.2% |
| | 保健指導判定 | 379 | 355 | 347 | 321 | 249 |
| | 120～139 | 22.8% | 21.6% | 22.1% | 22.1% | 20.3% |
| | 受診勧奨判定 | 357 | 351 | 342 | 331 | 258 |
| 140～ | 21.5% | 21.3% | 21.8% | 22.8% | 21.0% | |
| 不明・検査せず | 1 | 1 | 20 | 1 | 6 | |
| | | 0.1% | 0.1% | 1.3% | 0.1% | 0.5% |
| 管内 | 異常なし | 6,892 | 6,902 | 6,284 | 6,059 | 5,240 |
| | ～119 | 55.3% | 57.9% | 55.2% | 55.8% | 48.2% |
| | 保健指導判定 | 2,935 | 2,640 | 2,609 | 2,484 | 2,123 |
| | 120～139 | 23.6% | 22.1% | 22.9% | 22.9% | 19.5% |
| | 受診勧奨判定 | 2,618 | 2,371 | 2,441 | 2,260 | 1,922 |
| 140～ | 21.0% | 19.9% | 21.4% | 20.8% | 17.7% | |
| 不明・検査せず | 9 | 10 | 54 | 59 | 88 | |
| | | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.5% | 0.8% |
| 石川県 | 異常なし | 44,908 | 44,319 | 41,843 | 40,891 | 35,968 |
| | ～119 | 53.6% | 54.4% | 52.8% | 52.1% | 54.0% |
| | 保健指導判定 | 20,232 | 19,361 | 18,973 | 19,009 | 15,853 |
| | 120～139 | 24.1% | 23.8% | 23.9% | 24.2% | 23.8% |
| | 受診勧奨判定 | 18,638 | 17,706 | 18,401 | 18,441 | 14,621 |
| 140～ | 22.2% | 21.8% | 23.2% | 23.5% | 22.0% | |
| 不明・検査せず | 12 | 11 | 54 | 99 | 159 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(9) 結果－AST(GOT)－

| | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 七尾市 | 異常なし | 4,045 | 3,710 | 3,614 | 3,406 | 2,716 |
| | 8～30 | 87.0% | 86.1% | 87.4% | 88.9% | 86.5% |
| | 保健指導判定 | 523 | 512 | 437 | 363 | 363 |
| | 31～50 | 11.2% | 11.9% | 10.6% | 9.5% | 11.6% |
| | 受診勧奨判定 | 84 | 89 | 82 | 64 | 62 |
| | 51～ | 1.8% | 2.1% | 2.0% | 1.7% | 2.0% |
| 不明・検査せず | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 羽咋市 | 異常なし | 1,932 | 1,863 | 1,853 | 1,844 | 1,565 |
| | 8～30 | 88.9% | 86.3% | 86.7% | 88.1% | 86.0% |
| | 保健指導判定 | 204 | 251 | 248 | 211 | 223 |
| | 31～50 | 9.4% | 11.6% | 11.6% | 10.1% | 12.3% |
| | 受診勧奨判定 | 37 | 46 | 36 | 39 | 31 |
| | 51～ | 1.7% | 2.1% | 1.7% | 1.9% | 1.7% |
| 不明・検査せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 志賀町 | 異常なし | 2,194 | 2,112 | 1,933 | 1,887 | 1,646 |
| | 8～30 | 86.7% | 87.0% | 87.4% | 87.0% | 86.6% |
| | 保健指導判定 | 289 | 261 | 242 | 247 | 210 |
| | 31～50 | 11.4% | 10.7% | 10.9% | 11.4% | 11.0% |
| | 受診勧奨判定 | 45 | 53 | 36 | 36 | 45 |
| | 51～ | 1.8% | 2.2% | 1.6% | 1.7% | 2.4% |
| 不明・検査せず | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 宝達志水町 | 異常なし | 1,256 | 1,140 | 1,154 | 1,142 | 1,077 |
| | 8～30 | 87.3% | 82.8% | 86.2% | 87.0% | 83.9% |
| | 保健指導判定 | 151 | 208 | 159 | 148 | 166 |
| | 31～50 | 10.5% | 15.1% | 11.9% | 11.3% | 12.9% |
| | 受診勧奨判定 | 32 | 29 | 25 | 23 | 41 |
| | 51～ | 2.2% | 2.1% | 1.9% | 1.8% | 3.2% |
| 不明・検査せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 中能登町 | 異常なし | 1,467 | 1,421 | 1,346 | 1,265 | 1,053 |
| | 8～30 | 88.4% | 86.3% | 85.8% | 87.1% | 85.7% |
| | 保健指導判定 | 163 | 188 | 185 | 159 | 137 |
| | 31～50 | 9.8% | 11.4% | 11.8% | 11.0% | 11.2% |
| | 受診勧奨判定 | 29 | 37 | 36 | 27 | 37 |
| | 51～ | 1.7% | 2.2% | 2.3% | 1.9% | 3.0% |
| 不明・検査せず | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 管内 | 異常なし | 10,894 | 10,246 | 9,900 | 9,544 | 8,057 |
| | 8～30 | 87.5% | 85.9% | 86.9% | 87.9% | 86.0% |
| | 保健指導判定 | 1,330 | 1,420 | 1,271 | 1,128 | 1,099 |
| | 31～50 | 10.7% | 11.9% | 11.2% | 10.4% | 11.7% |
| | 受診勧奨判定 | 227 | 254 | 215 | 189 | 216 |
| | 51～ | 1.8% | 2.1% | 1.9% | 1.7% | 2.3% |
| 不明・検査せず | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 異常なし | 73,419 | 70,860 | 69,376 | 68,639 | 57,438 |
| | 8～30 | 87.6% | 87.1% | 87.5% | 87.5% | 86.2% |
| | 保健指導判定 | 8,672 | 8,851 | 8,232 | 8,146 | 7,520 |
| | 31～50 | 10.3% | 10.9% | 10.4% | 10.4% | 11.3% |
| | 受診勧奨判定 | 1,696 | 1,682 | 1,666 | 1,653 | 1,641 |
| | 51～ | 2.0% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.5% |
| 不明・検査せず | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(10) 結果－ALT(GPT)－

| | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 七尾市 | 異常なし | 4,019 | 3,690 | 3,569 | 3,321 | 2,649 |
| | 5～30 | 86.4% | 85.6% | 86.3% | 86.6% | 84.3% |
| | 保健指導判定 | 487 | 480 | 426 | 393 | 372 |
| | 31～50 | 10.5% | 11.1% | 10.3% | 10.3% | 11.8% |
| | 受診勧奨判定 | 146 | 141 | 138 | 119 | 120 |
| | 51～ | 3.1% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 3.8% |
| 不明・検査せず | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 羽咋市 | 異常なし | 1,886 | 1,838 | 1,836 | 1,796 | 1,522 |
| | 5～30 | 86.8% | 85.1% | 85.9% | 85.8% | 83.7% |
| | 保健指導判定 | 232 | 252 | 225 | 223 | 235 |
| | 31～50 | 10.7% | 11.7% | 10.5% | 10.6% | 12.9% |
| | 受診勧奨判定 | 55 | 70 | 76 | 75 | 62 |
| | 51～ | 2.5% | 3.2% | 3.6% | 3.6% | 3.4% |
| 不明・検査せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 志賀町 | 異常なし | 2,191 | 2,083 | 1,906 | 1,869 | 1,604 |
| | 5～30 | 86.6% | 85.8% | 86.2% | 86.1% | 84.4% |
| | 保健指導判定 | 260 | 274 | 240 | 246 | 227 |
| | 31～50 | 10.3% | 11.3% | 10.9% | 11.3% | 11.9% |
| | 受診勧奨判定 | 77 | 69 | 65 | 55 | 70 |
| | 51～ | 3.0% | 2.8% | 2.9% | 2.5% | 3.7% |
| 不明・検査せず | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 宝達志水町 | 異常なし | 1,243 | 1,174 | 1,135 | 1,133 | 1,052 |
| | 5～30 | 86.4% | 85.3% | 84.8% | 86.3% | 81.9% |
| | 保健指導判定 | 150 | 155 | 157 | 137 | 168 |
| | 31～50 | 10.4% | 11.3% | 11.7% | 10.4% | 13.1% |
| | 受診勧奨判定 | 46 | 48 | 46 | 43 | 64 |
| | 51～ | 3.2% | 3.5% | 3.4% | 3.3% | 5.0% |
| 不明・検査せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 中能登町 | 異常なし | 1,472 | 1,408 | 1,342 | 1,269 | 1,033 |
| | 5～30 | 88.7% | 85.5% | 85.6% | 87.4% | 84.1% |
| | 保健指導判定 | 139 | 173 | 165 | 135 | 147 |
| | 31～50 | 8.4% | 10.5% | 10.5% | 9.3% | 12.0% |
| | 受診勧奨判定 | 48 | 65 | 60 | 47 | 47 |
| | 51～ | 2.9% | 3.9% | 3.8% | 3.2% | 3.8% |
| 不明・検査せず | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 管内 | 異常なし | 10,811 | 10,193 | 9,788 | 9,388 | 7,860 |
| | 5～30 | 86.8% | 85.5% | 86.0% | 86.4% | 83.9% |
| | 保健指導判定 | 1,268 | 1,334 | 1,213 | 1,134 | 1,149 |
| | 31～50 | 10.2% | 11.2% | 10.7% | 10.4% | 12.3% |
| | 受診勧奨判定 | 372 | 393 | 385 | 339 | 363 |
| | 51～ | 3.0% | 3.3% | 3.4% | 3.1% | 3.9% |
| 不明・検査せず | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 異常なし | 72,323 | 69,704 | 67,742 | 66,965 | 55,882 |
| | 5～30 | 86.3% | 85.6% | 85.4% | 85.4% | 83.9% |
| | 保健指導判定 | 8,627 | 8,834 | 8,626 | 8,610 | 7,894 |
| | 31～50 | 10.3% | 10.9% | 10.9% | 11.0% | 11.9% |
| | 受診勧奨判定 | 2,837 | 2,855 | 2,906 | 2,863 | 2,823 |
| | 51～ | 3.4% | 3.5% | 3.7% | 3.6% | 4.2% |
| 不明・検査せず | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(11) 結果－ γ -GT(γ -GTP)－

| | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 七尾市 | 異常なし | 3,961 | 3,651 | 3,546 | 3,279 | 2,695 |
| | 5～30 | 85.1% | 84.7% | 85.8% | 85.5% | 85.8% |
| | 保健指導判定 | 470 | 462 | 418 | 405 | 322 |
| | 31～50 | 10.1% | 10.7% | 10.1% | 10.6% | 10.3% |
| | 受診勧奨判定 | 220 | 198 | 168 | 149 | 124 |
| | 51～ | 4.7% | 4.6% | 4.1% | 3.9% | 3.9% |
| 不明・検査せず | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 羽咋市 | 異常なし | 1,886 | 1,850 | 1,836 | 1,827 | 1,571 |
| | 5～30 | 86.8% | 85.6% | 85.9% | 87.2% | 86.4% |
| | 保健指導判定 | 209 | 224 | 205 | 194 | 171 |
| | 31～50 | 9.6% | 10.4% | 9.6% | 9.3% | 9.4% |
| | 受診勧奨判定 | 78 | 86 | 96 | 73 | 77 |
| | 51～ | 3.6% | 4.0% | 4.5% | 3.5% | 4.2% |
| 不明・検査せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 志賀町 | 異常なし | 2,122 | 2,035 | 1,867 | 1,819 | 1,589 |
| | 5～30 | 83.9% | 83.8% | 84.4% | 83.8% | 83.6% |
| | 保健指導判定 | 280 | 274 | 249 | 256 | 213 |
| | 31～50 | 11.1% | 11.3% | 11.3% | 11.8% | 11.2% |
| | 受診勧奨判定 | 126 | 118 | 95 | 95 | 99 |
| | 51～ | 5.0% | 4.9% | 4.3% | 4.4% | 5.2% |
| 不明・検査せず | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 宝達志水町 | 異常なし | 1,224 | 1,154 | 1,144 | 1,131 | 1,080 |
| | 5～30 | 85.1% | 83.8% | 85.5% | 86.1% | 84.1% |
| | 保健指導判定 | 150 | 153 | 132 | 119 | 130 |
| | 31～50 | 10.4% | 11.1% | 9.9% | 9.1% | 10.1% |
| | 受診勧奨判定 | 65 | 70 | 62 | 63 | 74 |
| | 51～ | 4.5% | 5.1% | 4.6% | 4.8% | 5.8% |
| 不明・検査せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 中能登町 | 異常なし | 1,431 | 1,410 | 1,335 | 1,256 | 1,048 |
| | 5～30 | 86.2% | 85.6% | 85.1% | 86.5% | 85.3% |
| | 保健指導判定 | 168 | 164 | 155 | 133 | 123 |
| | 31～50 | 10.1% | 10.0% | 9.9% | 9.2% | 10.0% |
| | 受診勧奨判定 | 60 | 72 | 77 | 62 | 56 |
| | 51～ | 3.6% | 4.4% | 4.9% | 4.3% | 4.6% |
| 不明・検査せず | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 管内 | 異常なし | 10,624 | 10,100 | 9,728 | 9,312 | 7,983 |
| | 5～30 | 85.3% | 84.7% | 85.4% | 85.7% | 85.2% |
| | 保健指導判定 | 1,277 | 1,277 | 1,159 | 1,107 | 959 |
| | 31～50 | 10.3% | 10.7% | 10.2% | 10.2% | 10.2% |
| | 受診勧奨判定 | 549 | 544 | 498 | 442 | 430 |
| | 51～ | 4.4% | 4.6% | 4.4% | 4.1% | 4.6% |
| 不明・検査せず | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 異常なし | 71,016 | 68,929 | 67,114 | 66,360 | 56,307 |
| | 5～30 | 84.8% | 84.7% | 84.7% | 84.6% | 84.5% |
| | 保健指導判定 | 8,943 | 8,734 | 8,472 | 8,381 | 7,087 |
| | 31～50 | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.6% |
| | 受診勧奨判定 | 3,827 | 3,731 | 3,685 | 3,696 | 3,204 |
| | 51～ | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.7% | 4.8% |
| 不明・検査せず | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(12) 結果－血糖値・ヘモグロビンA1c－

| | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 七尾市 | 異常なし | 2,287 | 1,955 | 1,980 | 1,803 | 1,429 |
| | 空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満 | 49.2% | 45.3% | 47.9% | 47.0% | 45.5% |
| | 保健指導判定 | 1,945 | 1,938 | 1,734 | 1,669 | 1,371 |
| | 空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満 | 41.8% | 45.0% | 41.9% | 43.5% | 43.6% |
| | 受診勧奨判定 | 414 | 417 | 417 | 359 | 341 |
| | 空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上 | 8.9% | 9.7% | 10.1% | 9.4% | 10.9% |
| | 不明・検査せず | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 羽咋市 | 異常なし | 1,068 | 1,028 | 946 | 973 | 787 |
| | 空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満 | 49.1% | 47.6% | 44.3% | 46.5% | 43.3% |
| | 保健指導判定 | 910 | 924 | 982 | 898 | 825 |
| | 空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満 | 41.9% | 42.8% | 46.0% | 42.9% | 45.4% |
| | 受診勧奨判定 | 195 | 208 | 209 | 222 | 207 |
| | 空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上 | 9.0% | 9.6% | 9.8% | 10.6% | 11.4% |
| | 不明・検査せず | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 志賀町 | 異常なし | 1,264 | 1,164 | 1,043 | 1,024 | 884 |
| | 空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満 | 50.0% | 47.9% | 47.2% | 47.2% | 46.5% |
| | 保健指導判定 | 1,019 | 1,013 | 952 | 902 | 802 |
| | 空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満 | 40.3% | 41.7% | 43.1% | 41.6% | 42.2% |
| | 受診勧奨判定 | 242 | 247 | 216 | 244 | 215 |
| | 空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上 | 9.6% | 10.2% | 9.8% | 11.2% | 11.3% |
| | 不明・検査せず | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 宝達志水町 | 異常なし | 726 | 617 | 650 | 622 | 568 |
| | 空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満 | 50.5% | 44.8% | 48.6% | 47.4% | 44.2% |
| | 保健指導判定 | 565 | 590 | 550 | 535 | 546 |
| | 空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満 | 39.3% | 42.8% | 41.1% | 40.7% | 42.5% |
| | 受診勧奨判定 | 148 | 170 | 138 | 156 | 170 |
| | 空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上 | 10.3% | 12.3% | 10.3% | 11.9% | 13.2% |
| | 不明・検査せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中能登町 | 異常なし | 734 | 681 | 669 | 573 | 489 |
| | 空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満 | 44.2% | 41.3% | 42.7% | 39.5% | 39.8% |
| | 保健指導判定 | 761 | 776 | 747 | 706 | 590 |
| | 空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満 | 45.8% | 47.1% | 47.6% | 48.6% | 48.0% |
| | 受診勧奨判定 | 162 | 189 | 151 | 172 | 148 |
| | 空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上 | 9.8% | 11.5% | 9.6% | 11.8% | 12.1% |
| | 不明・検査せず | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 管内 | 異常なし | 6,079 | 5,445 | 5,288 | 4,995 | 4,157 |
| | 空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満 | 48.8% | 45.7% | 46.4% | 46.0% | 44.4% |
| | 保健指導判定 | 5,200 | 5,241 | 4,965 | 4,710 | 4,134 |
| | 空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満 | 41.8% | 44.0% | 43.6% | 43.4% | 44.1% |
| | 受診勧奨判定 | 1,161 | 1,231 | 1,131 | 1,153 | 1,081 |
| | 空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上 | 9.3% | 10.3% | 9.9% | 10.6% | 11.5% |
| | 不明・検査せず | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 石川県 | 異常なし | 46,776 | 44,315 | 42,623 | 42,507 | 34,348 |
| | 空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満 | 55.8% | 54.4% | 53.8% | 54.2% | 51.6% |
| | 保健指導判定 | 30,234 | 30,035 | 29,580 | 28,677 | 25,409 |
| | 空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満 | 36.1% | 36.9% | 37.3% | 36.6% | 38.2% |
| | 受診勧奨判定 | 6,673 | 7,035 | 7,070 | 7,247 | 6,837 |
| | 空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上 | 8.0% | 8.6% | 8.9% | 9.2% | 10.3% |
| | 不明・検査せず | 0 | 12 | 4 | 9 | 7 |
| | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

* 空腹時血糖があるものは空腹時血糖の値で判定、空腹時血糖が無くHbA1cがあるものはHbA1c、空腹時血糖もHbA1cもないもので、随時血糖があるものは随時血糖で判定

10) 経年推移

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(13) 結果－尿検査－

| | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 七尾市 | 尿検査(蛋白) | (-) (±) | 4,393 | 4,070 | 3,899 | 3,573 | 2,890 |
| | | (%) | 94.4% | 94.4% | 94.3% | 93.2% | 92.0% |
| | | (+) 以上 | 253 | 239 | 224 | 242 | 245 |
| | | (%) | 5.4% | 5.5% | 5.4% | 6.3% | 7.8% |
| | 不明・検査せず | | 6 | 2 | 11 | 18 | 6 |
| | | (%) | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.5% | 0.2% |
| | | (-) (±) | 4,441 | 4,083 | 3,874 | 3,585 | 2,975 |
| | | (%) | 95.5% | 94.7% | 93.7% | 93.5% | 94.7% |
| | 尿検査(糖) | (+) 以上 | 206 | 226 | 249 | 230 | 160 |
| | | (%) | 4.4% | 5.2% | 6.0% | 6.0% | 5.1% |
| | | 不明・検査せず | 5 | 2 | 11 | 18 | 6 |
| | | (%) | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.5% | 0.2% |
| 羽咋市 | 尿検査(蛋白) | (-) (±) | 2,095 | 2,093 | 2,004 | 1,950 | 1,688 |
| | | (%) | 96.4% | 96.9% | 93.8% | 93.1% | 92.8% |
| | | (+) 以上 | 76 | 66 | 127 | 143 | 126 |
| | | (%) | 3.5% | 3.1% | 5.9% | 6.8% | 6.9% |
| | 不明・検査せず | | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| | | (%) | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.3% |
| | | (-) (±) | 2,051 | 2,051 | 2,057 | 2,005 | 1,726 |
| | | (%) | 94.4% | 95.0% | 96.3% | 95.7% | 94.9% |
| | 尿検査(糖) | (+) 以上 | 120 | 108 | 74 | 88 | 88 |
| | | (%) | 5.5% | 5.0% | 3.5% | 4.2% | 4.8% |
| | | 不明・検査せず | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| | | (%) | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.3% |
| 志賀町 | 尿検査(蛋白) | (-) (±) | 2,371 | 2,276 | 2,099 | 2,016 | 1,766 |
| | | (%) | 93.7% | 93.7% | 94.9% | 92.9% | 92.9% |
| | | (+) 以上 | 151 | 138 | 110 | 151 | 132 |
| | | (%) | 6.0% | 5.7% | 5.0% | 7.0% | 6.9% |
| | 不明・検査せず | | 8 | 14 | 2 | 3 | 3 |
| | | (%) | 0.3% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| | | (-) (±) | 2,403 | 2,276 | 2,059 | 2,028 | 1,800 |
| | | (%) | 95.0% | 93.7% | 93.1% | 93.5% | 94.7% |
| | 尿検査(糖) | (+) 以上 | 120 | 138 | 151 | 140 | 98 |
| | | (%) | 4.7% | 5.7% | 6.8% | 6.5% | 5.2% |
| | | 不明・検査せず | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 |
| | | (%) | 0.3% | 0.6% | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
| 宝達志水町 | 尿検査(蛋白) | (-) (±) | 1,366 | 1,288 | 1,261 | 1,228 | 1,162 |
| | | (%) | 94.9% | 93.5% | 94.2% | 93.5% | 90.5% |
| | | (+) 以上 | 70 | 87 | 75 | 80 | 116 |
| | | (%) | 4.9% | 6.3% | 5.6% | 6.1% | 9.0% |
| | 不明・検査せず | | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| | | (%) | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.5% |
| | | (-) (±) | 1,368 | 1,299 | 1,261 | 1,208 | 1,188 |
| | | (%) | 95.1% | 94.3% | 94.2% | 92.0% | 92.5% |
| | 尿検査(糖) | (+) 以上 | 66 | 76 | 76 | 100 | 90 |
| | | (%) | 4.6% | 5.5% | 5.7% | 7.6% | 7.0% |
| | | 不明・検査せず | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| | | (%) | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.5% |
| 中能登町 | 尿検査(蛋白) | (-) (±) | 1,578 | 1,570 | 1,467 | 1,353 | 1,126 |
| | | (%) | 95.1% | 95.3% | 93.6% | 93.2% | 91.7% |
| | | (+) 以上 | 77 | 76 | 99 | 96 | 96 |
| | | (%) | 4.6% | 4.6% | 6.3% | 6.6% | 7.8% |
| | 不明・検査せず | | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| | | (%) | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.5% |
| | | (-) (±) | 1,573 | 1,562 | 1,490 | 1,376 | 1,157 |
| | | (%) | 94.8% | 94.8% | 95.0% | 94.8% | 94.2% |
| | 尿検査(糖) | (+) 以上 | 82 | 83 | 77 | 73 | 65 |
| | | (%) | 4.9% | 5.0% | 4.9% | 5.0% | 5.3% |
| | | 不明・検査せず | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| | | (%) | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.5% |
| 管内 | 尿検査(蛋白) | (-) (±) | 11,803 | 11,297 | 10,730 | 10,120 | 8,632 |
| | | (%) | 94.8% | 94.7% | 94.2% | 93.2% | 92.1% |
| | | (+) 以上 | 627 | 606 | 635 | 712 | 715 |
| | | (%) | 5.0% | 5.1% | 5.6% | 6.6% | 7.6% |
| | 不明・検査せず | | 24 | 20 | 23 | 30 | 26 |
| | | (%) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| | | (-) (±) | 11,836 | 11,271 | 10,741 | 10,202 | 8,846 |
| | | (%) | 95.0% | 94.5% | 94.3% | 93.9% | 94.4% |
| | 尿検査(糖) | (+) 以上 | 594 | 631 | 627 | 631 | 501 |
| | | (%) | 4.8% | 5.3% | 5.5% | 5.8% | 5.3% |
| | | 不明・検査せず | 24 | 21 | 20 | 29 | 26 |
| | | (%) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 石川県 | 尿検査(蛋白) | (-) (±) | 79,626 | 76,997 | 75,503 | 74,215 | 62,229 |
| | | (%) | 95.0% | 94.6% | 95.2% | 94.6% | 93.4% |
| | | (+) 以上 | 4,074 | 4,324 | 3,686 | 4,111 | 4,271 |
| | | (%) | 4.9% | 5.3% | 4.6% | 5.2% | 6.4% |
| | 不明・検査せず | | 90 | 76 | 88 | 114 | 101 |
| | | (%) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| | | (-) (±) | 80,577 | 77,806 | 74,882 | 73,864 | 62,696 |
| | | (%) | 96.2% | 95.6% | 94.5% | 94.2% | 94.1% |
| | 尿検査(糖) | (+) 以上 | 3,129 | 3,517 | 4,311 | 4,464 | 3,794 |
| | | (%) | 3.7% | 4.3% | 5.4% | 5.7% | 5.7% |
| | | 不明・検査せず | 84 | 74 | 84 | 112 | 111 |
| | | (%) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(14) 結果－クレアチニン－

| | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 七尾市 | 検査実施者数 | 4,603 | 4,274 | 4,096 | 3,805 | 3,123 |
| | % | 98.9% | 99.1% | 99.1% | 99.3% | 99.4% |
| | 異常なし | 4,545 | 4,220 | 4,055 | 3,754 | 3,081 |
| | 男性 $\leq 1.2\text{mg/dl}$ 女性 $\leq 1.0\text{mg/dl}$ | 98.7% | 98.7% | 99.0% | 98.7% | 98.7% |
| | 要医療 | 58 | 54 | 41 | 51 | 42 |
| 男性 $1.2\text{mg/dl} <$ 女性 $1.0\text{mg/dl} <$ | 1.3% | 1.3% | 1.0% | 1.3% | 1.3% | |
| 羽咋市 | 検査実施者数 | 2,130 | 2,131 | 2,095 | 2,041 | 1,773 |
| | % | 98.0% | 98.7% | 98.0% | 97.5% | 97.5% |
| | 異常なし | 2,109 | 2,108 | 2,077 | 2,010 | 1,736 |
| | 男性 $\leq 1.2\text{mg/dl}$ 女性 $\leq 1.0\text{mg/dl}$ | 99.0% | 98.9% | 99.1% | 98.5% | 97.9% |
| | 要医療 | 21 | 23 | 18 | 31 | 37 |
| 男性 $1.2\text{mg/dl} <$ 女性 $1.0\text{mg/dl} <$ | 1.0% | 1.1% | 0.9% | 1.5% | 2.1% | |
| 志賀町 | 検査実施者数 | 2,502 | 2,411 | 2,201 | 2,149 | 1,888 |
| | % | 98.9% | 99.3% | 99.5% | 99.0% | 99.3% |
| | 異常なし | 2,462 | 2,371 | 2,168 | 2,105 | 1,847 |
| | 男性 $\leq 1.2\text{mg/dl}$ 女性 $\leq 1.0\text{mg/dl}$ | 98.4% | 98.3% | 98.5% | 98.0% | 97.8% |
| | 要医療 | 40 | 40 | 33 | 44 | 41 |
| 男性 $1.2\text{mg/dl} <$ 女性 $1.0\text{mg/dl} <$ | 1.6% | 1.7% | 1.5% | 2.0% | 2.2% | |
| 宝達志水町 | 検査実施者数 | 1,416 | 1,362 | 1,312 | 1,313 | 1,257 |
| | % | 98.4% | 98.9% | 98.1% | 100.0% | 97.9% |
| | 異常なし | 1,395 | 1,345 | 1,301 | 1,298 | 1,226 |
| | 男性 $\leq 1.2\text{mg/dl}$ 女性 $\leq 1.0\text{mg/dl}$ | 98.5% | 98.8% | 99.2% | 98.9% | 97.5% |
| | 要医療 | 21 | 17 | 11 | 23 | 31 |
| 男性 $1.2\text{mg/dl} <$ 女性 $1.0\text{mg/dl} <$ | 1.5% | 1.2% | 0.8% | 1.8% | 2.5% | |
| 中能登町 | 検査実施者数 | 1,576 | 1,559 | 1,557 | 1,444 | 1,215 |
| | % | 94.9% | 94.7% | 99.3% | 99.4% | 98.9% |
| | 異常なし | 1,541 | 1,530 | 1,530 | 1,419 | 1,195 |
| | 男性 $\leq 1.2\text{mg/dl}$ 女性 $\leq 1.0\text{mg/dl}$ | 97.8% | 98.1% | 98.3% | 98.3% | 98.4% |
| | 要医療 | 35 | 29 | 27 | 25 | 20 |
| 男性 $1.2\text{mg/dl} <$ 女性 $1.0\text{mg/dl} <$ | 2.2% | 1.9% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | |
| 管内 | 検査実施者数 | 12,227 | 11,737 | 11,261 | 10,752 | 9,256 |
| | % | 98.2% | 98.4% | 98.9% | 99.0% | 98.8% |
| | 異常なし | 12,052 | 11,574 | 11,131 | 10,586 | 9,085 |
| | 男性 $\leq 1.2\text{mg/dl}$ 女性 $\leq 1.0\text{mg/dl}$ | 98.6% | 98.6% | 98.8% | 98.5% | 98.2% |
| | 要医療 | 175 | 163 | 130 | 174 | 171 |
| 男性 $1.2\text{mg/dl} <$ 女性 $1.0\text{mg/dl} <$ | 1.4% | 1.4% | 1.2% | 1.6% | 1.8% | |
| 石川県 | 検査実施者数 | 82,212 | 79,772 | 78,014 | 76,606 | 64,567 |
| | % | 98.1% | 98.0% | 98.4% | 97.7% | 96.9% |
| | 異常なし | 81,065 | 78,540 | 77,013 | 75,389 | 63,365 |
| | 男性 $\leq 1.2\text{mg/dl}$ 女性 $\leq 1.0\text{mg/dl}$ | 98.6% | 98.5% | 98.7% | 98.4% | 98.1% |
| | 要医療 | 1,147 | 1,232 | 1,001 | 1,217 | 1,202 |
| 男性 $1.2\text{mg/dl} <$ 女性 $1.0\text{mg/dl} <$ | 1.4% | 1.5% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告 討結果報告

(15) 結果-推算系球体濾過量-

| | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 七尾市 | 検査実施者数 | 4,437 | 4,272 | 3,969 | 3,713 | 3,123 | |
| | % | 95.4% | 99.1% | 96.0% | 96.9% | 99.4% | |
| | ステージ1・2 | 60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白- | 3,356 | 3,249 | 2,938 | 2,709 | 2,294 |
| | | % | 75.6% | 76.1% | 74.0% | 73.0% | 73.5% |
| | ステージ3 | 50~60ml/min/ 1.73m ² 未満 | 727 | 669 | 700 | 676 | 554 |
| | | % | 16.4% | 15.7% | 17.6% | 18.2% | 17.7% |
| | | 40~50ml/min/ 1.73m ² 未満 | 167 | 167 | 154 | 137 | 145 |
| | % | 3.8% | 3.9% | 3.9% | 3.7% | 4.6% | |
| | 30~40ml/min/ 1.73m ² 未満 | 29 | 21 | 24 | 34 | 25 | |
| | | % | 0.7% | 0.5% | 0.6% | 0.9% | 0.8% |
| ステージ4・5 | 30ml/min/1.73m ² 未満 | 13 | 18 | 6 | 9 | 9 | |
| | % | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| 60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+以上 | 145 | 148 | 147 | 148 | 96 | | |
| | % | 3.3% | 3.5% | 3.7% | 4.0% | 3.1% | |
| CKD該当者 | 1,081 | 1,023 | 1,031 | 1,004 | 829 | | |
| % | 24.4% | 23.9% | 26.0% | 27.0% | 26.5% | | |
| 羽咋市 | 検査実施者数 | 2,062 | 2,121 | 2,011 | 1,978 | 1,773 | |
| | % | 94.9% | 98.2% | 94.1% | 94.5% | 97.5% | |
| | ステージ1・2 | 60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白- | 1,586 | 1,674 | 1,565 | 1,477 | 1,278 |
| | | % | 76.9% | 78.9% | 77.8% | 74.7% | 72.1% |
| | ステージ3 | 50~60ml/min/ 1.73m ² 未満 | 330 | 309 | 300 | 341 | 324 |
| | | % | 16.0% | 14.6% | 14.9% | 17.2% | 18.3% |
| | | 40~50ml/min/ 1.73m ² 未満 | 85 | 78 | 83 | 82 | 88 |
| | % | 4.1% | 3.7% | 4.1% | 4.1% | 5.0% | |
| | 30~40ml/min/ 1.73m ² 未満 | 9 | 18 | 13 | 13 | 14 | |
| | | % | 0.4% | 0.8% | 0.6% | 0.7% | 0.8% |
| ステージ4・5 | 30ml/min/1.73m ² 未満 | 4 | 4 | 7 | 11 | 10 | |
| | % | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | |
| 60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+以上 | 48 | 38 | 43 | 54 | 59 | | |
| | % | 2.3% | 1.8% | 2.1% | 2.7% | 3.3% | |
| CKD該当者 | 476 | 447 | 446 | 501 | 495 | | |
| % | 23.1% | 21.1% | 22.2% | 25.3% | 27.9% | | |
| 志賀町 | 検査実施者数 | 2,420 | 2,404 | 2,142 | 2,094 | 1,888 | |
| | % | 95.7% | 99.0% | 96.9% | 96.5% | 99.3% | |
| | ステージ1・2 | 60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白- | 1,805 | 1,797 | 1,573 | 1,516 | 1,351 |
| | | % | 74.6% | 74.8% | 73.4% | 72.4% | 71.6% |
| | ステージ3 | 50~60ml/min/ 1.73m ² 未満 | 409 | 407 | 366 | 371 | 363 |
| | | % | 16.9% | 16.9% | 17.1% | 17.7% | 19.2% |
| | | 40~50ml/min/ 1.73m ² 未満 | 97 | 84 | 93 | 107 | 92 |
| | % | 4.0% | 3.5% | 4.3% | 5.1% | 4.9% | |
| | 30~40ml/min/ 1.73m ² 未満 | 18 | 29 | 16 | 23 | 23 | |
| | | % | 0.7% | 1.2% | 0.7% | 1.1% | 1.2% |
| ステージ4・5 | 30ml/min/1.73m ² 未満 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | |
| | % | 0.4% | 0.2% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | |
| 60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+以上 | 82 | 81 | 84 | 69 | 50 | | |
| | % | 3.4% | 3.4% | 3.9% | 3.3% | 2.6% | |
| CKD該当者 | 615 | 607 | 569 | 578 | 537 | | |
| % | 25.4% | 25.2% | 26.6% | 27.6% | 28.4% | | |
| 宝達志水町 | 検査実施者数 | 1,367 | 1,361 | 1,291 | 1,288 | 1,257 | |
| | % | 95.0% | 98.8% | 96.5% | 98.1% | 97.9% | |
| | ステージ1・2 | 60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白- | 979 | 998 | 977 | 910 | 871 |
| | | % | 71.6% | 73.3% | 75.7% | 70.7% | 69.3% |
| | ステージ3 | 50~60ml/min/ 1.73m ² 未満 | 266 | 243 | 211 | 229 | 247 |
| | | % | 19.5% | 17.9% | 16.3% | 17.8% | 19.6% |
| | | 40~50ml/min/ 1.73m ² 未満 | 65 | 58 | 49 | 74 | 70 |
| | % | 4.8% | 4.3% | 3.8% | 5.7% | 5.6% | |
| | 30~40ml/min/ 1.73m ² 未満 | 10 | 8 | 8 | 10 | 18 | |
| | | % | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 1.4% |
| ステージ4・5 | 30ml/min/1.73m ² 未満 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| | % | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | |
| 60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+以上 | 43 | 48 | 41 | 59 | 45 | | |
| | % | 3.1% | 3.5% | 3.2% | 4.6% | 3.6% | |
| CKD該当者 | 388 | 363 | 314 | 378 | 388 | | |
| % | 28.4% | 26.7% | 24.3% | 29.3% | 30.7% | | |
| 中能登町 | 検査実施者数 | 1,534 | 1,552 | 1,509 | 1,401 | 1,215 | |
| | % | 92.4% | 94.2% | 96.2% | 96.5% | 98.9% | |
| | ステージ1・2 | 60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白- | 1,131 | 1,212 | 1,134 | 1,054 | 899 |
| | | % | 73.7% | 78.1% | 75.1% | 75.2% | 74.0% |
| | ステージ3 | 50~60ml/min/ 1.73m ² 未満 | 258 | 214 | 252 | 240 | 207 |
| | | % | 16.8% | 13.8% | 16.7% | 17.1% | 17.0% |
| | | 40~50ml/min/ 1.73m ² 未満 | 86 | 62 | 60 | 57 | 49 |
| | % | 5.6% | 4.0% | 4.0% | 4.1% | 4.0% | |
| | 30~40ml/min/ 1.73m ² 未満 | 16 | 18 | 21 | 17 | 8 | |
| | | % | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.2% | 0.7% |
| ステージ4・5 | 30ml/min/1.73m ² 未満 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | |
| | % | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.6% | |
| 60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+以上 | 36 | 40 | 36 | 29 | 45 | | |
| | % | 2.3% | 2.6% | 2.4% | 2.1% | 3.7% | |
| CKD該当者 | 403 | 340 | 375 | 347 | 316 | | |
| % | 26.3% | 21.9% | 24.9% | 24.8% | 26.0% | | |
| 管内 | 検査実施者数 | 11,820 | 11,710 | 10,922 | 10,474 | 9,256 | |
| | % | 94.9% | 98.2% | 95.9% | 96.4% | 98.8% | |
| | ステージ1・2 | 60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白- | 8,857 | 8,930 | 8,187 | 7,666 | 6,693 |
| | | % | 74.9% | 76.3% | 75.0% | 73.2% | 72.3% |
| | ステージ3 | 50~60ml/min/ 1.73m ² 未満 | 1,990 | 1,842 | 1,829 | 1,857 | 1,695 |
| | | % | 16.8% | 15.7% | 16.7% | 17.7% | 18.3% |
| | | 40~50ml/min/ 1.73m ² 未満 | 500 | 449 | 439 | 457 | 444 |
| | % | 4.2% | 3.8% | 4.0% | 4.4% | 4.8% | |
| | 30~40ml/min/ 1.73m ² 未満 | 82 | 94 | 82 | 97 | 88 | |
| | | % | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 1.0% |
| ステージ4・5 | 30ml/min/1.73m ² 未満 | 37 | 40 | 34 | 38 | 41 | |
| | % | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | |
| 60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+以上 | 354 | 355 | 351 | 359 | 295 | | |
| | % | 3.0% | 3.0% | 3.2% | 3.4% | 3.2% | |
| CKD該当者 | 2,963 | 2,780 | 2,735 | 2,808 | 2,563 | | |
| % | 25.1% | 23.7% | 25.0% | 26.8% | 27.7% | | |
| 石川県 | 検査実施者数 | 78,978 | 79,563 | 75,351 | 74,373 | 64,627 | |
| | % | 94.3% | 97.7% | 95.0% | 94.8% | 97.0% | |
| | ステージ1・2 | 60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白- | 60,126 | 58,881 | 56,066 | 55,026 | 46,577 |
| | | % | 76.1% | 74.0% | 74.4% | 74.0% | 72.1% |
| | ステージ3 | 50~60ml/min/ 1.73m ² 未満 | 12,488 | 13,667 | 12,757 | 12,639 | 11,695 |
| | | % | 15.8% | 17.2% | 16.9% | 17.0% | 18.1% |
| | | 40~50ml/min/ 1.73m ² 未満 | 3,078 | 3,460 | 3,155 | 3,194 | 3,175 |
| | % | 3.9% | 4.3% | 4.2% | 4.3% | 4.9% | |
| | 30~40ml/min/ 1.73m ² 未満 | 613 | 744 | 660 | 661 | 659 | |
| | | % | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.0% |
| ステージ4・5 | 30ml/min/1.73m ² 未満 | 252 | 267 | 252 | 268 | 271 | |
| | % | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | |
| 60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+以上 | 2,421 | 2,544 | 2,461 | 2,585 | 2,250 | | |
| | % | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.5% | 3.5% | |
| CKD該当者 | 18,852 | 20,682 | 19,285 | 19,347 | 18,050 | | |
| % | 23.9% | 26.0% | 25.6% | 26.0% | 27.9% | | |

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より