

テングコウモリ

Murina leucogaster Milne-Edwards

コウモリ目ヒナコウモリ科

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

国カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

選定理由

全国的にも分布している県が少なく、本県においても生息の確認場所が少ない。

国内分布

北海道、本州、四国、九州から知られる。

県内分布

白山周辺など4箇所を確認されている。

生態

大木の多い地域では樹洞を昼間の隠れ家にするが、洞穴内でもよく見つかる。しかし、単独でいることが多く、10頭を越える群れはほとんど見つからない。夜には隠れ家から出て、飛翔する昆虫類を捕食する。一般に森林内の下層で捕食するらしい。出産は初夏に行われる。

生息地の条件


自然林内に生息。

生存の危機

その分布などがよく分からないうちに、生息環境が開発されてしまっている。(A)

参考文献

- 佐野明・上馬康生 1981. 白山地域に生息する翼手類について. 石川県白山自然保護センター研究報告. 7: 23-29.
- 山本輝正 1990. 石川県のコウモリ. 石川の生物, 石川の生物編集会(編). 137-142. 石川県高等学校研究会生物部会.
- 山本輝正・野崎英吉 2002. 白山地域におけるコウモリ目相. 石川県白山自然保護センター研究報告, 29: 73-76.
- 山本輝正・上馬康生・野崎英吉 2005. 石川県白山地域のコウモリ相調査—1998年～2005年の調査結果より—. 石川県白山自然保護センター研究報告. 32: 25-30.



県内の分布