

# ヒメホオヒゲコウモリ

コウモリ目ヒナコウモリ科

石川県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類

国カテゴリー

なし

*Myotis ikonnikovi* Ognev

## 選定理由

ブナ林帯より上部の原生林が残された地域にのみ生息するため、県内においてもその生息地はきわめて限られている。

## 国内分布

日本では北海道、および中国地方を除く本州から知られる。

## 県内分布

白山市白峰の市ノ瀬六万山周辺と同市中宮の3箇所ですべて1頭がそれぞれ捕獲されているのみである。

## 生態

昼間のねぐらは樹洞と思われるが、本州の一部では家屋でも繁殖をしている。初夏に1仔を出産する。

## 生息地の条件


原生林が残された地域にのみ生息するため、県内においてもその生息地はきわめて限られている。

## 生存の危機

白山周辺で行われてきた天然林の伐採により、徐々にその生息地及び生息数が減少しているものと考えられる。(A)

## 参考文献

- 佐野明・上馬康生 1981. 白山地域に生息する翼手類について. 石川県白山自然保護センター研究報告. 7: 23-29.
- 山本輝正 1990. 石川県のコウモリ. 石川の生物, 石川の生物編集会(編). 137-142. 石川県高等学校研究会生物部会.
- 山本輝正 1998a. 3-1-2 哺乳類 コウモリ目, 環境庁委託 平成9年度 生態系多様性地域調査(白山) 報告書. 142-147.
- 山本輝正 1998b. 3-2-2 白山地域のコウモリ類, 環境庁委託 平成9年度 生態系多様性地域調査(白山) 報告書. 227-235.
- 山本輝正・上馬康生・野崎英吉 2005. 石川県白山地域のコウモリ相調査—1998年～2005年の調査結果より—. 石川県白山自然保護センター研究報告. 32: 25-30.



県内の分布