

# エゾコセアカアメンボ カメムシ目アメンボ科

*Gerris (Macrogerris) yezoensis* (Miyamoto)

石川県カテゴリー 情報不足

国カテゴリー なし

## 選定理由

北方系の種で、県内では白山山系の1箇所を確認されているのみである。本県は国内分布の西限である。

## 形態

体長10~15mm。胸背部および前翅は暗褐色~暗赤褐色。体形、色彩はコセアカアメンボによく似ており、外見での区別は困難である。腹部第7結合板後縁の突出は鈍い。オス生殖器の末端片の形状は特異的で、長い嘴状となる。長翅型のみ。

## 国内分布

北海道、礼文島、本州。

## 県内分布

白山山系の1箇所の池（殿池）の1950年代の記録のみである。

## 生態

水面に落下した小昆虫などを捕食する。

## 生息地の条件

寒冷地の池沼に生息する。


## 生存の危機

生息地は高山帯であり、人為的な環境の変化が生じにくいいため、現在も生息していると思われるが、調査する必要がある。

## 参考文献

宮本正一 1961. 日本昆虫分類図説アメンボ科. 1(3)1-39. 北隆館. 東京.  
根来 尚 1988. 富山県産アメンボの分布と生息環境について. 日本生態学会誌, 38(1): 9-18.  
村路雅彦 2003. 日本産 *Gerris* 属 *Macrogerris* 亜属の mtDNA 塩基配列, 外部形態および交尾行動の解析: 系統開の進化的関係について. 昆虫ニューシリーズ, 6(3): 141-156.

写真(図)はありません。



県内の分布