

# ヒラマキガイモドキ

*Polypylis hemisphaerula* (Benson)

## モノアラガイ目ヒラマキガイ科

石川県カテゴリー 情報不足

国カテゴリー 準絶滅危惧

### 選定理由

改訂版国の貝類レッドリスト（2007）で新たに準絶滅危惧にランクされ、石川県でも生息環境の改変が大きいと考えられるため。

### 形態

殻径4~5mmの円盤形の殻を持つ。殻中央の窪み（臍孔）は狭く深い。殻内の白いひだ（ほぼ90度ごとに形成される）が透けて見える。

### 国内分布

日本全国。

### 県内分布

加賀市、金沢市、内灘町、津幡町、輪島市、珠洲市。

### 生態

棚田の土水路や溜池に生息。

### 生存の危機


圃場整備と溜池改修。水田や溜池放棄。（A, B）

### 特記事項


石川県にはヒラマキガイ類として*Gyraulus*属の種も生息するが詳細不明。ヒラマキガイモドキは*Gyraulus*属からは殻の形状で区別が容易である。なお、ヒラマキミズマイマイ*G.chinensis spirillus*は改訂版国の貝類レッドリスト（2007）で情報不足にランクされている。

### 参考文献

長谷川巖 1998. 福井県の陸水生貝類の概要と目録. 福井県自然環境保全調査研究会陸水生生物部会（編）. 福井県の陸水生生物：91-123. 福井県  
増田修・内山りゅう 2004. 日本産淡水貝類図鑑②汽水域を含む全国の淡水貝類. 240pp. ピーシーズ. 東京.



写真提供者：石原一彦



県内の分布