

石川県漁海況情報

520号
2023年4月17日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

寒ブリ漁・フクラギ漁・冬期のスルメイカ漁のまとめ

- 寒ブリの水揚量は過去10年平均並み、フクラギの水揚量は過去5年平均を下回りました。
- 冬期のスルメイカの水揚量は162トンであり、過去5年平均を下回りました。

石川県主要港の水揚状況（期間:3月16日～31日）

- 定置網ではブリが好調でした。



石川県周辺海域の水温（期間:4月3日～7日）

■ 沿岸の海面水温 4月7日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は11～12℃台で、過去5年平均との差は±0.0～+0.5℃程度でした。

■ 沿岸観測ブイの水温 今期の水温は12.1～13.5℃で、3月中旬から1.0℃上昇しました。過去5年平均との差は+0.4～+1.3℃でした。

■ 港内の水温 今期の水温は13.0～14.9℃で、前年同時期との差は+0.5～+1.7℃、過去5年平均との差は+0.4～+2.4℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

単位(℃)

観測位置	日間平均 4/3～4/7	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	13.5	+1.9	+1.2
②富来沿岸	12.1	データなし	+0.4
③門前沿岸	休止中	データなし	データなし
④曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	12.1	+1.3	+1.1
⑥小浦沿岸	12.2	データなし	+0.9
⑦鶴川沿岸	12.2	データなし	+0.8
⑧岸端沿岸	12.4	データなし	+1.3

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）

単位(℃)


観測位置	日間平均 4/3～4/7	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	13.3	+0.5	+0.4
⑩宇出津港	13.0	+1.7	+1.4
⑪石崎港	14.9	+1.2	+2.4

寒ブリ漁およびフクラギ漁のまとめ

■ 今期（2022年11月～2023年3月）の定置網による寒ブリの水揚量は493トンで、前年（233トン）を上回り、過去10年平均（489トン）並みでした。漁海況情報510号では、今期の水揚量は207トンで、過去10年平均を下回ると予想しましたが、予想を上回る水揚量でした。今漁期は11月初旬から堅調に水揚げが続き、特に年末年始にまとまった水揚げが見られました。また、3月も水揚げが多くなりました。このような漁況となった要因として、富山湾の水温が高く、寒ブリが能登半島沿岸に来遊しやすい海況であったことが考えられます。

■ 今期（2022年10月～2023年3月）の定置網によるフクラギの水揚量は235トンで、前年（305トン）および過去5年平均（345トン）を下回りました。漁海況情報508号では10～11月の水揚量を148トン、同511号では12～3月の水揚量を135トン（合計283トン）と予想しており、予想を下回りました。

単位(ト) 主要10港の定置網によるフクラギ・ブリ水揚量




冬期のスルメイカ漁のまとめ（期間:2023年1月～3月）

■ 今期の定置網による水揚量は162トンで、前年（303トン）および過去5年平均（381トン）を下回りました。漁海況情報512号では、今期の水揚量は前年および過去5年平均を下回ると予想しており、予想通りの漁況となりました。

■ 3月の水揚量は93トンで過去5年平均（101トン）並みでしたが、1～2月の水揚げ（69トン）が振るわず、2002年以降で2番目に少ない水揚げでした。

単位(ト) 主要10港の定置網によるスルメイカ水揚量



石川県主要港の水揚げ状況（期間:3月16日～31日）

■ 定置網 ブリ・サワラ（サゴシ）は前年を上回り、マイワシ・スルメイカ・サバは前年を下回りました。

■ まき網 マイワシ・サバ主体の水揚げでした。

■ 底びき網・ごち網 アカガレイ・アマエビ・フグ類・ナマコは前年を上回り、ニギス・マダラは前年並み、ハタハタは前年を下回りました。

■ 刺網・釣り・その他 フグ類・ヤナギバチメなど多くの魚種で前年を上回りました。

集計期間 3月16日～3月31日

(単位:トン)

水揚港 魚 種	橋 立	金 沢	富 来	輪 島	珠洲 地区	宇出津	七 尾 地 区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
まいわし					322.6	336.2	293.8	952.6	1814.2
ぶり	0.0		0.3		4.3	73.3	49.0	126.8	0.0
するめいか					0.1	0.8	82.0	82.8	125.8
さば	0.0				0.9	1.6	74.1	76.6	215.5
かたくちいわし					0.1	20.1		20.3	128.6
かわはぎ(ウマヅラ)	0.0		0.0		3.2	8.7	4.5	16.4	14.8
まあじ	0.6		0.1		1.9	1.7	7.8	12.1	8.9
さわら・さごし	7.9		0.1		0.1	1.1	1.1	10.3	0.8
まだい	0.2		0.3		0.3	0.7	1.1	2.6	1.4
やりいか	0.0		0.0		0.1	1.2	0.7	2.1	4.7
その他	0.5		0.7		2.2	6.8	17.3	27.5	79.3
合 計	9.2	0.0	1.5	0.0	335.8	452.2	531.4	1330.1	2394.0
まき網									
まいわし	—				280.6	—		280.6	0.0
さば	—				146.5	—		146.5	0.0
すずき	—				3.6	—		3.6	0.0
その他	—				0.4	—		0.4	80.7
合 計	—	0.0	0.0	0.0	431.1	—	0.0	431.1	80.7
底びき網・ごち網									
あかがれい	60.2	10.5	9.7	17.7	0.2	0.3	—	98.6	41.8
あまえび	2.5	22.9	7.4	7.7	1.2		—	41.8	33.2
にぎす	3.6	16.2	18.4	0.4		0.6	—	39.2	46.5
ふぐ類	1.1	0.9	4.9	23.9	0.0		—	30.9	15.6
まだら	2.1	1.3	0.8	13.9	0.3		—	18.4	17.0
そうはち	10.3	3.9	0.0	3.3	0.1		—	17.6	8.7
なまこ		0.1	14.7		0.4		—	15.2	4.3
がすえび(トゲザコヒト他)	0.3	6.1	1.5	0.4	0.2		—	8.4	7.8
はたはた	0.4	0.3	0.1	3.2	0.4	2.9	—	7.3	11.8
なめたがれい(ヒレグロ)	2.6	0.7	0.3	3.3	0.1		—	7.1	4.8
その他	14.4	18.3	9.0	37.1	3.4	0.2	—	82.5	73.3
合 計	97.6	81.3	66.8	111.1	6.3	4.1	—	367.1	264.8
刺網・釣り・その他									
ふぐ類	0.0	0.0	10.4	91.1	0.1	0.0	0.0	101.6	31.7
べにずわいがに		47.8	25.8	11.0				84.6	69.3
やなぎばちめ(ウスマル)	0.0	0.1	3.2	5.6	0.7	0.3	0.5	10.5	6.6
ぶり			0.0	9.9	0.1	0.0	0.0	10.1	1.8
がんど			0.0	9.4	0.3	0.0	0.0	9.8	5.0
なまこ			0.4	0.0	1.0	6.8	1.4	9.6	5.1
あからばちめ(ハツメ)			0.0	7.6				7.6	4.5
さば			0.4	3.1		0.6	0.0	4.2	3.3
その他	2.1	2.7	6.5	22.0	2.7	7.8	6.5	50.3	37.7
合 計	2.1	50.6	46.9	159.8	4.9	15.5	8.5	288.4	164.9
小型いか釣り									
するめいか						1.4		1.4	3.6
総 計	108.9	131.9	115.1	270.9	778.1	473.2	539.9	2418.1	2908.0

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

石川県漁海況情報

521号
2023年5月2日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

スルメイカの漁況の見通し(予報期間:5月～7月)

- 石川県沿岸の小型イカ釣りによる水揚量は過去5年平均並みになる見込みです。

石川県主要港の水揚状況(期間:4月1日～15日)

- 定置網ではブリ・サワラ・サゴンが好調でした。



石川県周辺海域の海面水温(期間:4月16日～20日)

■ 沿岸の海面水温 4月20日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は12～13℃台で、過去5年平均との差は±0.0～+0.5℃程度でした。

■ 沿岸観測ブイの水温 今期の水温は12.6～14.2℃で、4月上旬から0.7℃上昇しました。前年同時期との差は+0.9～+2.4℃、過去5年平均との差は+0.9～+1.4℃でした。

■ 港内の水温 今期の水温は13.4～14.7℃で、前年同時期との差は-1.7～+1.9℃、過去5年平均との差は+0.6～+1.1℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温(深度10mの値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 4/16～4/20	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	14.2	+2.3	+1.4
②富来沿岸	13.7	+2.4	+1.3
③門前沿岸	休止中	データなし	データなし
④曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	12.8	+0.9	+1.0
⑥小浦沿岸	12.7	データなし	+1.0
⑦鵜川沿岸	12.7	データなし	+1.0
⑧岸端沿岸	12.6	データなし	+0.9

港内の水温(深度1.5m・午前9時の値)

単位(℃)


観測位置	日間平均 4/16～4/20	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	14.7	+1.9	+1.1
⑩宇出津港	13.4	+0.2	+1.1
⑪石崎港	14.3	-1.7	+0.6

石川県沿岸のスルメイカ漁況の見通し（予報期間:5月～7月）

■ 石川県沿岸の5～7月の小型イカ釣りによるスルメイカの水揚量は水温の影響をうけて増減していると考えられます。5月中旬の佐渡島沖(A)の50m深水温が低いほど、能登半島沖(B)の50m深水温が高いほど、水揚量が多くなる傾向がみられます。これは、春以降の水温上昇とともに能登半島周辺まで北上したスルメイカが佐渡島沖の水温の低い海域に進路を阻まれて滞留し、その結果として本県沿岸に漁場が長期間形成されるためと考えられます。海況数値モデルでは、今年5月中旬の能登半島沖と佐渡島沖の50m深水温は過去5年平均並みになると予測されており、水温と水揚量の関係式から、今期の小型イカ釣りによる水揚量は2,286トンと見積もられ、過去5年平均(2,292トン)並みになると予想されます。

小型イカ釣りのスルメイカ水揚量(5月～7月)

水揚量(千トン)



石川県主要港の水揚状況（期間:4月1日～15日）


■ 定置網 ブリ・フグ類・サワラ・サゴシ・ウマヅラハギは前年を上回り、マイワシ・スルメイカ・カタクチイワシは前年を下回りました。マイワシは501トン水揚げされました。マイワシの2月から4月前半の累計は8,705トンで、前年(9,712トン)を下回り、過去5年平均(7,203トン)を上回りました。

■ まき網 マイワシ・サバ主体の水揚げでした。


■ 底びき網・ごち網 アカガレイは前年並み、ニギス・アマエビ・フグ類等は前年を下回りました。アマエビは16トン水揚げされました。アマエビの2月から4月前半の累計は114トンで、前年(97トン)を上回り、過去5年平均(110トン)並みでした。

■ 刺網・釣り・その他 ベニズワイガニは前年並み、フグ類・ヤナギバチメは前年を下回りました。

定置網のマイワシ水揚量



底びき網のアマエビ水揚量



集計期間 4月1日～4月15日

(単位:トン)

水揚港 魚 種	橋 立	金 沢	富 来	輪 島	珠洲 地区	宇出津	七 尾 地 区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
まいわし					457.0	40.8	3.6	501.4	1105.2
ぶり	0.1		7.1	0.0	5.2	154.7	117.7	284.8	1.2
ふぐ類	0.0	0.0	0.5	0.5	0.3	28.2	7.9	37.5	17.9
さわら・さごし	1.8	2.3	2.2	0.1	0.4	11.9	8.0	26.7	16.3
するめいか			0.0		0.0	2.8	23.6	26.4	81.4
かたくちいわし					2.0	14.5	3.0	19.5	68.4
めじ(ワマガリ)		0.0	0.7	0.0	2.4	6.0	8.0	17.1	27.4
かわはぎ(ワザラ)	0.0		0.3	0.0	3.0	8.2	4.8	16.2	8.3
まあじ	0.5	0.3	0.4	0.1	1.4	1.9	6.1	10.6	8.4
うるめいわし					0.0	0.1	9.6	9.7	2.3
その他	0.6	0.1	2.9	0.2	4.3	16.1	23.0	47.2	153.3
合 計	3.0	2.7	14.1	0.9	476.0	285.1	215.2	997.0	1490.2
まき網									
まいわし	—	51.1			30.9	—		82.1	0.3
さば	—	39.8			18.0	—		57.8	119.1
すずき	—	3.8			0.8	—		4.5	0.0
その他	—	0.1			0.1	—		0.2	10.1
合 計	—	94.8	0.0	0.0	49.8	—	0.0	144.6	129.5
底びき網・ごち網									
にぎす	0.4	5.2	15.8		0.1	1.2	—	22.7	52.8
あかがれい	10.5	1.7	5.0		0.1		—	17.3	15.5
あまえび	2.4	10.0	2.0	0.4	1.8		—	16.5	36.8
ふぐ類	1.4	0.2	12.3		0.0		—	13.9	45.0
そうはち	5.5	0.4			0.1		—	5.9	7.6
がすえび(トゲザコヒ他)	0.5	3.0	0.4	0.0	0.4		—	4.3	8.9
なまこ			2.4		0.4		—	2.8	8.8
みずうお(ノコギリ)	0.2	1.1	0.8	0.0	0.2		—	2.3	1.8
はたはた	0.1	0.0	0.0	0.0	1.3	0.5	—	1.9	13.3
なめたがれい(ヒレグ)	1.0	0.2	0.2	0.1	0.0		—	1.6	5.4
その他	7.9	2.3	3.5	0.0	2.1		—	15.7	82.2
合 計	29.9	24.1	42.3	0.6	6.4	1.7	—	105.0	277.9
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		37.3	8.9	5.1				51.3	44.9
ふぐ類			1.3	11.1	0.0	0.0	0.1	12.5	32.7
やなぎばちめ(ウスマール)		0.0	0.2	4.2	0.1	0.4	0.1	5.0	18.1
さより				0.0	0.2	1.3	0.7	2.2	1.4
ぶり	0.0			1.0		0.0	1.2	2.2	3.2
まあじ	0.0		0.0	0.4		0.4	1.0	1.9	0.7
まだこ	0.0			0.0	0.0	0.6	1.2	1.9	1.0
さざえ			0.9	0.1	0.3	0.4	0.1	1.8	1.4
その他	0.6	1.6	11.5	2.8	0.8	2.9	2.1	22.3	55.0
合 計	0.6	38.8	22.8	24.8	1.4	6.1	6.5	101.0	158.2
小型いか釣り									
するめいか								0.0	4.8
総 計	33.5	160.4	79.2	26.4	533.6	292.9	221.6	1347.7	2060.6

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

石川県漁海況情報

522号
2023年5月16日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

日本海沿岸のスルメイカ来遊量の見通し（予報期間:5月～7月）

- 日本海沿岸の来遊量は前年および過去5年平均を下回る見込みです。

石川県主要港の水揚げ状況（期間:4月16日～30日）

- 定置網ではマイワシ・カタクチイワシが好調でした。
- 底びき網ではアカガレイが好調でした。



石川県周辺海域の海面水温（期間:5月1日～5日）

■ 沿岸の海面水温 5月5日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は13～15℃台で、過去5年平均との差は－0.5～±0.0℃程度でした。

■ 沿岸観測ブイの水温 今期の水温は13.3～15.4℃で、4月下旬から約1.0℃上昇しました。前年同時期との差は+0.2～+2.1℃、過去5年平均との差は±0.0～+0.8℃でした。

■ 港内の水温 今期の水温は14.1～16.2℃で、前年同時期との差は+0.5～+1.8℃、過去5年平均との差は+0.5～+0.6℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

単位（℃）

観測位置	日間平均 5/1～5/5	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	15.4	+1.6	+0.6
②富来沿岸	14.8	+2.1	+0.8
③門前沿岸	休止中	データなし	データなし
④曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	14.0	+1.3	+0.6
⑥小浦沿岸	13.6	データなし	+0.2
⑦鵜川沿岸	13.6	+0.8	+0.3
⑧岸端沿岸	13.3	+0.2	－0.0

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）


単位（℃）

観測位置	日間平均 5/1～5/5	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	16.1	+1.8	+0.6
⑩宇出津港	14.1	+0.5	+0.5
⑪石崎港	16.2	+0.5	+0.5

日本海沿岸のスルメイカ来遊量の見通し（予報期間:5月～7月）

■ 今年4月に漁獲加入前のスルメイカ（外套長2～10cm程度）の分布量を調べるため、本県を含む日本海側各府県と水産資源研究所が一斉に日本海で表層トロール調査を行いました。調査時に外套長5cm以上であったイカが5～7月の漁獲対象になります。外套長5cm以上のイカの調査点当たりの平均採集尾数は1.0尾で、前年（10.0尾）および過去5年平均（6.8尾）を下回りました。また、昨年秋に水産資源研究所が行った孵化幼生調査では、調査

スルメイカ分布量調査の結果





点当たりの平均分布密度は0.07尾で、前年（0.34尾）および過去10年平均（0.57尾）を下回りました（漁海況情報518号で報告済）。以上の調査結果に基づき、今期の日本海沿岸への来遊量は前年および過去5年平均を下回ると予想されています。日本海沿岸の漁況予報の詳細（2023年度第1回日本海スルメイカ長期漁況予報）については、水産庁の資源評価等推進委託事業ページ（<http://abchan.fra.go.jp/>）をご覧ください。なお、本県沿岸における小型イカ釣りの水揚量は、日本海各府県への来遊量だけでなく、能登半島周辺の水温の影響を受けて増減すると考えられます。前回の漁海況情報521号で報告したとおり、水温は過去5年平均並みになると予想されており、水揚量も過去5年平均になると予想しています。

石川県主要港の水揚状況（期間:4月16日～30日）

■ **定置網** マイワシ・カタクチイワシ・ブリは前年を上回り、サワラ・サゴシ・フグ類は前年を下回りました。

■ **底びき網・ごち網** アカガレイは前年を上回り、マダラ・ホッケは前年並み、ニギス・アマエビ・フグ類は前年を下回りました。アカガレイは34トン水揚げされました。2月から4月の累計は331トンで、前年（204トン）および過去5年平均（266トン）を上回りました。

■ **刺網・釣り・その他** ベニズワイガニは前年を上回り、フグ類は前年を下回りました。ベニズワイガニの2月から4月の累計は326トンで、前年（215トン）および過去5年平均（239トン）を上回りました。




集計期間 4月16日～4月30日

(単位:トン)

水揚港 魚 種	橋 立	金 沢	富 来	輪 島	珠洲 地区	宇出津	七 尾 地区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
まいわし				0.0	238.7	7.2	3.0	249.0	153.5
かたくちいわし					19.9	7.7	117.3	144.8	15.8
ぶり	1.1		10.7	1.8	2.9	36.6	64.5	117.6	72.8
さわら・さごし	0.7	0.9	0.2	0.5	0.7	16.4	32.3	51.7	79.8
ふぐ類	0.0	0.1	2.2	0.3	0.7	17.3	11.9	32.4	61.5
さば	0.0	0.0		0.2	0.9	4.1	25.5	30.7	17.2
まだい	0.3	0.0	5.0	2.7	4.0	6.8	11.4	30.1	25.8
まあじ	0.9	1.6	1.7	2.6	3.2	6.0	11.0	27.0	21.3
するめいか			0.0	0.0	0.1	2.1	19.1	21.3	59.1
かわはぎ(ウマヅラ)	0.1	0.0	1.8	0.9	2.3	6.2	5.3	16.5	9.3
その他	2.3	0.7	5.7	7.6	6.4	25.0	19.9	67.6	88.1
合 計	5.4	3.4	27.3	16.6	279.6	135.4	321.2	788.8	604.1
まき網									
さば	—			10.4		—		10.4	403.1
まあじ	—			8.3		—		8.3	4.7
うるめいわし	—			0.4		—		0.4	0.1
その他	—			0.1		—		0.1	1.2
合 計	—	0.0	0.0	19.3	0.0	—	0.0	19.3	409.1
底びき網・ごち網									
あかがれい	9.0	2.4	4.7	17.8	0.3		—	34.1	25.3
まだら	0.3	1.6	1.1	24.3	1.0		—	28.3	24.7
にぎす	0.7	8.2	13.2	1.4	0.1	3.5	—	27.0	45.4
あまえび	1.8	15.1	3.9	4.9	1.2		—	26.8	41.0
ほっけ	0.6	0.2	0.4	22.4	0.7		—	24.2	24.9
ふぐ類	0.1	0.4	4.5	7.7			—	12.6	38.0
あからばちめ(ハツメ)	0.4			6.8	0.2		—	7.4	0.1
そうはち	1.5	1.7		3.4	0.1		—	6.7	8.3
がすえび(トゲザコヒト 他)	0.6	4.9	0.6	0.3	0.3		—	6.6	8.2
さこだい(サグイ)	0.0	0.1	0.8	4.9			—	5.8	4.6
その他	4.3	4.3	7.2	23.5	2.7		—	42.0	66.5
合 計	19.3	38.8	36.3	117.3	6.4	3.5	—	221.7	287.0
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		35.4	25.4	13.0				73.7	26.6
ふぐ類			3.2	27.1	0.0	0.0	0.1	30.4	41.9
ぶり	0.0		2.2	12.5	0.0	0.0	3.5	18.2	5.7
やなぎばちめ(ウスマル)	0.0	0.1	1.9	14.8	0.1	0.4	0.2	17.5	24.7
いわがき				8.8			0.0	8.8	0.0
さざえ			0.5	0.2	0.4	1.5	0.4	2.9	2.6
がんど			0.2	2.1	0.0	0.0	0.5	2.8	2.6
さより					0.4	1.4	0.3	2.1	1.8
その他	1.6	1.9	10.5	11.6	1.7	9.4	4.2	41.0	58.2
合 計	1.7	37.4	43.8	90.0	2.6	12.8	9.2	197.5	164.0
小型いか釣り									
するめいか								0.0	2.5
総 計	26.4	79.6	107.4	243.2	288.6	151.8	330.4	1227.3	1466.7

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

石川県漁海況情報



523号

2023年6月19日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>

携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間：5月15日～22日）

- 今年5月のスルメイカの来遊量は前年および過去5年平均を下回っています。
- 魚体サイズは前年と同程度で、過去5年平均に比べてやや大きめです。

小型いか釣りのスルメイカ水揚状況（期間：5月1日～31日）

- 水揚量は前年および過去5年平均を下回っています。
- 入港1隻当たりの水揚量は前年および過去5年平均を下回っています。

石川県主要港の水揚状況（期間：5月1日～15日・5月16日～31日）

- 定置網ではマイワシが好調でした。

調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間：5月15日～22日）

■ 調査船白山丸は5月15～22日に能登半島沿岸から日本海沖合（大和堆南部）でイカ釣り調査を行いました。スルメイカの分布密度の指標であるCPUE（釣機1台1時間当たりの漁獲尾数）は0～1.5尾でした。今回調査の平均CPUEは0.5尾であり、前年同時期平均（2.7尾）および過去5年同時期平均（10.7尾）を下回りました。定点調査ではないため厳密には比較できませんが、今年5月調査時点のスルメイカの来遊量は前年および過去5年平均を下回っていると考えられます。

■ 本調査で漁獲したスルメイカの外套長（魚体サイズの指標）の平均値は18.3cmであり、魚体サイズは前年（18.1cm）と同程度で、過去5年平均（17.6cm）よりやや大きめでした。

調査船白山丸イカ釣り調査結果

操業日	操業位置	漁獲尾数	CPUE	外套長範囲(主な魚体)	表面水温	50m水温
5月15日	N37-29.0, E136-15.0	3	0.0	18～20cm(20cm)	17.1℃	12.23℃
5月16日	N37-46.7, E134-04.8	65	0.5	17～22cm(20cm)	16.1℃	13.98℃
5月17日	N38-20.1, E133-16.7	117	0.9	11～23cm(18cm)	16.1℃	12.62℃
5月18日	N38-41.7, E134-08.1	13	0.1	13～23cm(16cm)	15.4℃	7.33℃
5月19日	N39-04.4, E135-04.0	122	1.5	13～23cm(17cm)	16.3℃	12.86℃
5月20日	N38-23.6, E134-47.5	92	0.8	15～21cm(17cm)	16.9℃	12.25℃
5月21日	N38-41.1, E135-58.8	45	0.4	14～20cm(16cm)	16.7℃	12.75℃
5月22日	N38-09.7, E137-00.6	0	0		15.7℃	11.91℃



CPUE: 釣機1台1時間当たりの漁獲尾数、主な魚体: 漁獲尾数の多かったイカの外套長

小型いか釣りのスルメイカ水揚げ状況（期間:5月1日～31日）

■ 今年5月1日から5月31日の小型いか釣りによるスルメイカの水揚げ量は27トンであり、前年（132トン）および過去5年平均（393トン）を下回っています。

■ 銘柄（1箱当たりの入り尾数）別の箱数割合をみると、今年は20尾入りと25尾入りの割合が47%で、魚体サイズは前年および過去5年平均より大きめです。

■ 5月の延べ入港隻数を集計したところ、今年の入港隻数は224隻で、前年（582隻）および過去5年平均（1,190隻）を下回っています。今年5月の入港1隻当たりの水揚げ量は120kgで、前年（228kg）および過去5年平均（306kg）を下回っており、県沿岸へのスルメイカの来遊量は前年および過去5年平均を下回っていると考えられます。




石川県周辺海域の水温（期間:6月1日～5日）

■ 沿岸の海面水温 6月5日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は17～19℃台で、過去5年平均との差は-1.5～-1.0℃程度でした。

■ 沿岸観測ブイの水温 今期の水温は18.1～19.1℃で、前年同時期との差は-1.2～-0.5℃、過去5年平均との差は-0.9～+0.4℃でした。

■ 港内の水温 今期の水温は18.7～21.0℃で、前年同時期との差は-1.5～+0.4℃、過去5年平均との差は-1.1～+0.2℃でした。

石川県周辺の海面水温



石川県主要港の水揚げ状況（期間:5月1日～15日・5月16日～31日）

■ 定置網 マイワシ・マアジ・ウルメイワシは前年を上回り、サワラ・サゴシは前年を下回りました。

■ まき網 サバ・マイワシ・ウルメイワシは前年を上回りました。

■ 底びき網・ごち網 ニギスは前年を上回りました。

■ 刺網・釣り・その他 ベニズワイガニ・ヤナギバチメは前年を上回りました。

■ お知らせ 本情報は毎月2回発行していますが、今年5月末の情報については、漁獲量データ収集システムの一部変更・調整のため発行を中止しました。

集計期間 5月1日～5月15日

(単位:トン)

水揚港 魚種	橋立	金沢	富来	輪島	珠洲 地区	宇出津	七尾 地区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
まいわし			0.0		117.3	1.3	6.4	125.1	25.8
ぶり	0.3	0.0	3.5	1.4	1.4	45.6	69.4	121.7	102.5
まあじ	6.1	6.0	4.5	6.1	13.5	22.9	22.5	81.6	28.0
がんど	1.4	0.2	7.6	14.3	2.7	13.6	10.5	50.3	99.0
うるめいわし			0.5	0.0	5.4	20.3	23.3	49.6	0.5
ふぐ類	0.3	0.0	25.9	2.3	4.2	7.2	8.0	47.9	21.7
さわら・さごし	1.9	1.0	0.5	0.7	1.5	15.5	16.2	37.2	64.0
ふくらぎ・こぞくら	1.7	0.0	8.0	7.5	4.2	2.2	8.9	32.5	23.2
さば	0.2	0.1	3.0	2.0	0.8	18.8	7.5	32.5	15.1
まだい	0.7		4.1	2.3	2.6	2.6	16.3	28.5	46.4
その他	2.5	0.4	4.8	4.0	4.2	14.4	30.8	61.2	115.8
合 計	15.1	7.6	62.4	40.7	157.9	164.6	219.7	667.9	542.1
まき網									
さば	—		8.4	75.0		—		83.4	0.0
まあじ	—			22.8		—		22.8	0.0
うるめいわし	—		0.8	3.0		—		3.8	0.0
その他	—		12.8	21.6		—		34.4	2.0
合 計	—	0.0	22.0	122.5	0.0	—	0.0	144.5	2.0
底びき網・ごち網									
にぎす	2.4	10.8	22.5	8.1	2.3	3.0	—	48.9	37.6
ほっけ	0.4	0.0	0.4	38.8	0.8		—	40.4	28.7
あかがれい	8.6	3.2	4.2	14.4	0.1		—	30.6	25.5
あまえび	4.0	14.7	4.8	3.6	0.3		—	27.5	39.7
まだら	0.2	0.4	0.5	16.4	0.5		—	17.9	13.5
あからばちめ(ハツメ)	0.1			9.0	0.0		—	9.1	1.0
がすえび(トゲザコヒ他)	1.6	4.1	0.3	0.2	0.1		—	6.4	8.8
そうはち	3.6	0.9	0.0	1.4	0.0		—	6.0	4.8
ふぐ類	0.1	0.0	0.6	4.4			—	5.2	8.0
みずだこ	0.8	0.2	1.6	2.4	0.0		—	5.0	3.5
その他	6.1	4.2	6.1	21.6	3.1	0.3	—	41.4	48.6
合 計	28.0	38.5	41.0	120.5	7.3	3.2	—	238.4	219.7
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		20.9	20.8	9.9				51.6	27.6
ぶり			1.0	11.9	0.1	0.0	3.8	16.8	21.1
やなぎばちめ(ウスマル)	0.1	0.1	0.0	11.5	0.1	0.6	0.3	12.7	9.8
いわがき				11.7				11.7	11.3
ふぐ類			0.9	8.5		0.0	0.1	9.5	10.8
さざえ			1.3	0.5	0.7	2.5	1.0	5.9	4.5
がんど			0.4	2.3	0.1	0.2	0.2	3.1	3.1
さより					0.5	1.1	0.4	2.0	2.2
その他	1.5	1.5	10.7	17.8	1.7	5.0	4.2	42.3	49.9
合 計	1.6	22.5	35.1	74.1	3.0	9.5	9.9	155.8	140.3
小型いか釣り									
するめいか		1.1	0.5	0.6				2.1	9.0
総 計	44.7	69.7	161.0	358.3	168.2	177.3	229.6	1208.7	913.2

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

集計期間 5月16日～5月31日

(単位:トン)

水揚港 魚 種	橋 立	金 沢	富 来	輪 島	珠洲 地区	宇出津	七 尾 地 区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
まいわし						16.8	112.7	129.5	5.8
ぶり	1.7		89.1	7.1	0.5	5.6	15.9	119.9	59.9
まあじ	4.0	5.4	10.3	23.9	11.8	26.2	34.8	116.4	85.2
ふくらぎ・こぞくら	1.1	0.1	15.1	41.5	12.8	22.7	20.7	113.9	220.5
がんど	1.1	0.3	20.2	66.0	6.1	10.3	5.2	109.4	198.1
さば	0.1	0.1	3.5	4.7	0.2	43.2	48.5	100.2	74.8
ふぐ類	0.5	0.0	15.7	16.9	6.4	18.7	14.5	72.8	115.0
うるめいわし				0.0	0.8	7.6	34.7	43.0	12.0
まだい	0.4	0.0	3.1	1.1	1.6	3.1	2.1	11.5	31.6
さわら・さごし	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	3.0	2.6	7.0	43.1
その他	3.3	0.7	4.8	5.6	3.3	10.4	12.1	40.1	71.8
合 計	12.8	7.0	162.0	166.9	43.6	167.6	303.9	863.7	917.9
まき網									
さば	—		461.0	258.2		—		719.1	316.7
まいわし	—		203.7	5.1		—		208.8	7.1
うるめいわし	—		57.3	0.4		—		57.7	5.9
その他	—		68.4	3.4		—		71.8	8.5
合 計	—	0.0	790.4	267.1	0.0	—	0.0	1057.5	338.2
底びき網・ごち網									
にぎす	2.0	36.7	24.9	10.6	4.5	3.9	—	82.6	70.8
あまえび	7.0	38.5	3.1	4.7	1.8		—	55.0	65.8
ほっけ	0.2	0.2	0.9	25.7	0.9		—	27.8	63.8
あかがれい	2.8	3.9	2.9	4.2	0.4		—	14.2	30.3
がすえび(トゲザエビ他)	2.7	8.2	0.2	0.3	1.0		—	12.3	10.9
まだら	0.1	0.4	0.4	8.3	0.7		—	9.9	24.0
はたはた	0.1	0.0	0.3	0.5	5.8	0.5	—	7.2	27.0
するめいか	0.5	0.2	0.1	5.8	0.0		—	6.5	1.6
そうはち	2.6	1.6	0.0	1.1	0.1		—	5.4	8.3
みずだこ	0.8	0.3	1.5	1.7			—	4.2	6.5
その他	8.7	6.2	4.4	15.9	2.4		—	37.7	64.9
合 計	27.3	96.1	38.7	78.7	17.6	4.4	—	262.9	374.0
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		27.1	27.4	11.6				66.2	25.2
やなぎばちめ(ウスマル)	0.0	0.6	0.3	16.6	0.0	0.2	0.2	18.0	10.8
ぶり			0.5	10.3	0.0		4.3	15.2	15.6
さざえ			1.7	0.9	0.9	2.9	1.0	7.3	6.7
ふぐ類			0.9	5.9	0.0	0.2	0.2	7.2	12.2
まだい	0.0	0.0	0.1	5.5	0.1	0.1	0.3	6.1	7.8
まだこ	0.0	0.0		0.4	0.4	1.9	2.1	4.7	3.9
がんど			0.3	2.2	0.1	0.0	0.4	3.0	5.6
その他	1.8	0.7	12.9	26.2	1.2	3.5	2.3	48.7	63.4
合 計	1.9	28.4	44.2	79.5	2.8	8.8	10.8	176.3	151.1
小型いか釣り									
するめいか		0.7	7.1	3.8				11.6	54.7
総 計	42.0	132.3	1042.3	596.0	64.0	180.9	314.6	2372.0	1835.8

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

石川県漁海況情報

524号
2023年7月4日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

小型いか釣りのスルメイカ水揚げ状況（期間：5月1日～6月20日）

- 水揚げ量は前年および過去5年平均を下回っています。
- 魚体は前年および過去5年平均に比べて大きめです。

石川県主要港の水揚げ状況（期間：6月1日～15日）

- 定置網ではブリが好調でした。



石川県周辺海域の水温（期間：6月16日～20日）

■ **沿岸の海面水温** 6月20日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は18～21℃台で、過去5年平均との差は－1.5～－0.5℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は20.6～21.2℃で、6月上旬から約2.5℃上昇しました。前年同時期との差は＋0.8～＋2.0℃、過去5年平均との差は＋1.0～＋1.4℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は21.1～23.8℃で、前年同時期との差は＋1.7～＋2.3℃、過去5年平均との差は＋1.2～＋1.3℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

単位（℃）

観測位置	日間平均 6/16～6/20	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	休止中	データなし	データなし
②富来沿岸	21.2	+1.3	+1.4
③門前沿岸	20.6	+0.8	+1.1
④曾々木沿岸	20.8	データなし	+1.4
⑤小泊沿岸	20.8	+1.9	+1.3
⑥小浦沿岸	21.0	データなし	+1.0
⑦鶴川沿岸	20.8	+2.0	+1.0
⑧岸端沿岸	20.9	+1.7	+1.2

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）

単位（℃）



観測位置	日間平均 6/16～6/20	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	22.3	+1.9	+1.3
⑩宇出津港	21.1	+2.3	+1.2
⑪石崎港	23.8	+1.7	+1.2

小型いか釣りのスルメイカ水揚げ状況（期間:5月1日～6月20日）

■ 今年5月1日から6月20日の小型いか釣りによるスルメイカ水揚げ量は107トンであり、前年（565トン）および過去5年平均（1,144トン）を下回っています。

■ 銘柄（1箱当たりの入り尾数）別の箱数割合をみると、今年は20尾入りと25尾入りの割合が48%で、魚体サイズは前年および過去5年平均より大きめです。

■ 5月1日から6月20日の延べ入港隻数は604隻であり、前年（1,380隻）および過去5年平均（2,549隻）を下回っています。同期間の入港1隻当たりの水揚げ量を求めたところ、今年は146kgであり、前年（410kg）および過去5年平均（429kg）を下回っています。1隻当たりの水揚げ量が少ないことに加えて、入港隻数も少ないため、水揚げ量がより少なくなっています。6月20日現在、主な漁場は西海・門前沖にあり、佐渡以北ではまだ本格的な漁場は形成されていない模様です。





石川県主要港の水揚げ状況（期間:6月1日～15日）

■ 定置網 ブリ・マアジは前年を上回り、サバ・フクラギ・コゾクラ・フグ類・トビウオは前年を下回りました。マアジは165トン水揚げされました。マアジの4月前半月から6月前半の累計は410トンで、前年（263トン）および過去5年平均（246トン）を上回りました。

■ まき網 ウルメイワシは前年を上回り、サバは前年並み、マイワシは前年を下回りました。

■ 底びき網・ごち網 ニギス・アマエビ・アカガレイは前年を上回り、スルメイカは前年を下回りました。アマエビの3月から6月前半の累計は234トンで、前年（264トン）および過去5年平均（288トン）並みでした。

■ 刺網・釣り・その他 ベニズワイガニは前年並み、ヤナギバチメは前年を下回りました。



集計期間 6月1日～6月15日

(単位:トン)

水揚港 魚種	橋立	金沢	富来	輪島	珠洲 地区	宇出津	七尾 地区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
ぶり	1.3		197.9	19.0	1.0	4.2	0.9	224.3	38.8
まあじ	5.9	0.5	12.7	47.5	43.3	32.1	22.8	164.8	120.4
がんど	0.1	0.0	1.5	55.2	1.3	5.7	1.2	65.0	58.8
さば	0.3	0.0	6.7	27.7	1.7	6.8	5.6	48.8	215.0
ふくらぎ・こぞくら	0.5	0.0	5.4	3.8	18.8	4.5	6.9	39.9	100.0
ふぐ類	0.1	0.0	1.9	1.9	5.0	8.0	3.3	20.2	32.6
とびうお	1.1	0.1	0.3	5.0	0.5	1.2	1.1	9.2	28.6
まだい	0.3	0.0	1.3	0.7	0.8	1.9	1.3	6.4	9.7
かわはぎ(ワヅラ)	0.2		0.2	0.4	1.2	0.8	0.7	3.4	5.6
くろだい	0.2	0.0	0.2	0.1	0.2	1.3	1.0	3.0	1.8
その他	3.2	0.4	7.9	3.4	2.4	9.1	11.3	37.7	133.2
合 計	13.0	1.0	236.0	164.7	76.2	75.8	56.0	622.7	744.4
まき網									
さば	—		491.2	17.6		—		508.8	507.6
まいわし	—		96.2	2.1		—		98.3	182.2
うるめいわし	—		61.8	1.7		—		63.5	3.6
その他	—		8.1	26.3		—		34.4	5.2
合 計	—	0.0	657.2	47.8	0.0	—	0.0	705.0	698.6
底びき網・ごち網									
にぎす	2.1	35.5	21.0	13.1	4.9	2.7	—	79.2	49.5
あまえび	9.3	40.1		6.3	3.0		—	58.8	36.4
するめいか	0.5	0.8	0.2	31.0	0.1		—	32.7	79.7
ほっけ	0.2	1.2	0.7	23.0	1.4		—	26.5	28.0
あかがれい	3.1	2.5	1.5	5.1	0.6		—	12.8	6.9
がすえび(トゲザエビ他)	1.6	7.3	0.0	0.3	0.6		—	9.8	6.0
まだら	0.2	0.4	0.1	8.4	0.4		—	9.4	16.7
みずうお(ノゲンガ)	1.2	2.9		1.3	0.4		—	5.8	1.5
そうはち	1.8	1.7	0.0	1.8	0.4		—	5.6	4.8
みずだこ	1.0	1.0	0.7	2.8	0.0		—	5.5	5.0
その他	7.5	5.1	4.5	15.5	4.4		—	37.0	46.0
合 計	28.5	98.4	28.8	108.5	16.2	2.7	—	283.1	280.4
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		33.7	17.2	3.2				54.2	47.3
まだこ	0.1			1.2	0.8	2.9	2.8	7.8	4.3
さざえ			1.3	0.0	0.5	2.4	1.6	5.8	5.4
ぶり			0.0	2.6	0.0	0.0	2.2	4.9	4.0
あまだい	1.0	0.2	0.3	0.7	0.8	0.0	0.0	3.1	2.1
やなぎばちめ(ウスマル)	0.1		0.3	2.1	0.0	0.1	0.4	2.9	8.0
めっきだい(キダイ)	1.2	0.4	0.1	0.4	0.1			2.2	2.0
ふぐ類			0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.5	2.9
その他	1.2	1.3	2.3	7.9	1.7	5.3	1.8	21.5	33.7
合 計	3.6	35.7	21.5	19.5	3.9	10.6	8.9	103.9	109.7
小型いか釣り									
するめいか		4.8	14.8	3.0	0.2	0.1		22.9	78.4
総 計	45.1	140.0	958.4	343.4	96.6	89.2	64.9	1737.6	1911.5

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

石川県漁海況情報

525号
2023年7月20日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間:6月12日～18日）

- 能登半島沖から日本海中央部のスルメイカの分布量は前年および過去5年平均を下回りました。
- 魚体は前年および過去5年平均より大きめでした。

大型クラゲ情報（期間:6月17日～7月12日）

- 今のところ大量出現の兆候はみられません。

調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間:6月12日～18日）

■ スルメイカの資源状況を調べるため、6月中旬～7月中旬に日本海側道県研究機関と水産研究・教育機構の調査船が共同でスルメイカ漁場一斉調査を行っています。

■ 石川県水産総合センターの調査船白山丸は6月12～18日に能登半島沖から日本海中央部の定点でイカ釣り調査を行いました。スルメイカの分布密度の指標であるCPUE（釣機1台1時間当たりの漁獲尾数）は0～1.91尾でした。全調査点の平均CPUEは0.43尾であり、前年（3.10尾）および過去5年平均（3.78尾）を下回りました。このことから、調査時点の能登半島沖から日本海中央部のスルメイカ分布量は低水準であったと考えられます。本調査で漁獲したスルメイカの外套長（魚体サイズの指標）の平均値は19.0cmで、魚体は前年（15.5cm）および過去5年平均（16.6cm）よりも大きめでした。

■ 7月下旬に水産研究・教育機構から漁場一斉調査の全体結果と8～12月の漁況の見通しをまとめた「日本海スルメイカ長期予報」が公表されます。本情報でもその概要をお知らせする予定です。

調査船白山丸イカ釣り調査結果

操業日	操業位置	漁獲尾数	CPUE	外套長範囲(主な魚体)	表面水温	50m水温
6月12日	38-00.0N, 136-19.9E	8	0.06	14～22cm(14,15cm)	20.3℃	12.7℃
6月13日	38-40.8N, 135-00.9E	34	0.30	14～23cm(18cm)	21.4℃	14.7℃
6月14日	39-00.0N, 133-39.8E	0	0		22.5℃	9.0℃
6月15日	39-39.0N, 134-21.2E	221	1.91	15～24cm(18cm)	21.1℃	11.3℃
6月16日	39-39.9N, 135-01.4E	64	0.57	10～22cm(18cm)	22.5℃	13.3℃
6月17日	40-00.3N, 135-33.5E	9	0.07	10～21cm(15cm)	20.8℃	8.1℃
6月18日	38-58.1N, 135-40.5E	11	0.09	7～22cm(18cm)	22.3℃	11.4℃

CPUE: 釣機1台1時間当たりの漁獲尾数、主な魚体: 漁獲尾数の多かったイカの外套長

大型クラゲ情報（期間:6月17日～7月12日）

■ 水産研究・教育機構と漁業情報サービスセンターが7月12日までに発表した大型クラゲに関する情報は以下のとおりです。

対馬海峡 長崎県五島列島の定置網で6月29日に2個体（傘径:50cm）、7月10日に1個体（傘径:50cm）の入網がありました。水産研究・教育機構が6月17日に行ったフェリーによる博多・釜山間の目視調査では、大型クラゲは確認されませんでした。

東シナ海 水産研究・教育機構が6月19～25日に行った調査船陽光丸による調査では、目視で4個体（傘径:30～90cm）確認され、調査ネットで2個体（傘径:110cm）採集されました。

■ 今のところ大量出現の兆候はみられませんが、今後の動向には注意が必要です。水産総合センターでは、大型クラゲの出現情報を収集しています。県内で大型クラゲを見つけたときは当センターにお知らせください。


石川県周辺海域の水温（期間:7月1日～7月5日）

■ **沿岸の海面水温** 7月5日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は22～23℃台で、過去5年平均との差は-1.0～+0.5℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は22.8～23.6℃で、前年同時期との差は-0.9～+0.3、過去5年平均との差は+0.5～+1.2℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は22.5～24.8℃で、前年同時期との差は-2.0～-0.6℃、過去5年平均との差は-0.4～+0.5℃でした。

石川県周辺の海面水温



石川県主要港の水揚げ状況（期間:6月16日～30日）

■ **定置網** ブリ・ガンド・シイラは前年を上回り、サバ・マアジ・トビウオは前年を下回りました。ブリは86トン水揚げされました。4月から6月の累計は1,043トンで、前年（309トン）および過去5年平均（404トン）を上回っています。


■ **まき網** サバ・ウルメイワシは前年を上回り、マイワシは前年を下回りました。

■ **底びき網・ごち網** ニギス・アマエビ・スルメイカは前年を上回り、ホッケ・アカガレイ・マダラは前年を下回りました。

■ **刺し網・釣り・その他** サザエ・マダコ・マダイは前年を上回り、イワガキ・ヤナギバチメは前年を下回りました。

■ **小型いか釣り** スルメイカは前年を下回りました。

定置網のブリ水揚げ量



集計期間 6月16日～6月30日

(単位:トン)

水揚港 魚種	橋立	金沢	富来	輪島	珠洲 地区	宇出津	七尾 地区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
さば	0.3	0.7	13.2	52.6	21.1	1.5	1.2	90.6	359.4
まあじ	1.2	0.2	4.4	22.4	18.1	24.6	17.0	87.9	114.4
ぶり	1.0		58.1	18.7	0.9	6.5	0.2	85.6	34.1
ふくらぎ・こぞくら	0.1	0.0	3.7	15.1	4.9	1.5	5.5	30.8	29.3
がんど	0.0		0.6	12.3	0.6	15.0	1.0	29.5	16.0
とびうお	0.5	0.0	1.8	6.9	1.9	3.7	2.5	17.4	33.0
まだい	0.6		1.1	0.7	1.2	2.7	1.3	7.6	7.9
ふぐ類	0.0		1.5	1.0	0.4	2.4	1.0	6.3	13.3
しいら	0.0		5.3	0.1	0.0	0.1	0.1	5.6	3.8
するめいか			0.0	0.0	0.0	2.6	1.9	4.6	10.6
その他	4.5	0.3	7.8	6.2	4.1	6.6	13.6	43.2	51.9
合 計	8.2	1.3	97.6	136.0	53.2	67.2	45.3	408.9	673.5
まき網									
さば	—		369.3	36.0		—		405.3	201.1
まいわし	—		141.0	5.3		—		146.3	665.6
うるめいわし	—		62.5	3.7		—		66.1	53.5
その他	—		0.7	5.1		—		5.8	19.5
合 計	—	0.0	573.5	50.0	0.0	—	0.0	623.5	939.7
底びき網・ごち網									
にぎす	0.9	30.0	27.9	5.2	10.4	1.1	—	75.4	57.5
あまえび	14.0	40.9		5.3	3.5		—	63.7	51.2
するめいか	0.6	0.6	0.3	34.1	0.5		—	36.0	24.6
ほっけ	0.2	0.4	0.3	19.6	1.1		—	21.7	39.1
あかがれい	2.2	1.4	0.9	2.8	0.4		—	7.6	13.1
がすえび(トゲザコ他)	1.1	5.2		0.4	0.8		—	7.6	9.2
そうはち	0.8	0.6	0.0	4.5	0.3		—	6.2	8.6
みずうお(ノロゲン)	0.5	3.8		0.6	0.3		—	5.2	6.0
まだら	0.1	1.4	0.1	3.2	0.4		—	5.1	9.2
みずだこ	1.0	0.6	0.9	2.4	0.0		—	4.9	4.3
その他	6.2	6.5	3.0	12.4	5.1	0.4	—	33.6	42.1
合 計	27.7	91.3	33.4	90.4	22.9	1.5	—	267.1	264.9
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		33.2	9.3	8.6				51.1	46.3
いわがき	0.1			16.0		0.0		16.1	20.8
さざえ			3.0	2.7	0.8	2.1	1.3	10.0	8.3
やなぎばちめ(ウスハル)			0.1	8.4	0.0	0.0	0.4	8.9	12.6
まだこ	0.1			1.9	0.6	2.9	2.6	8.1	6.3
ふぐ類			0.0	4.2	0.0	0.1	0.0	4.3	3.4
あまだい	0.8	0.1	0.3	1.4	0.6	0.0	0.0	3.2	3.0
まだい	0.0		0.1	2.1	0.1	0.1	0.1	2.5	1.3
その他	1.6	1.1	2.1	21.8	1.8	5.5	1.7	35.7	31.7
合 計	2.6	34.5	15.0	67.1	3.9	10.8	6.0	139.9	133.5
小型いか釣り									
するめいか		6.2	22.8	2.2	4.9	2.6		38.7	247.9
総 計	38.6	133.2	742.2	345.8	84.9	82.1	51.3	1478.2	2259.7

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

石川県漁海況情報

526号
2023年8月2日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

日本海スルメイカ長期予報（予報期間:8月～12月）

- 日本海全体の来遊量は前年および過去5年平均を下回る見込みです。
- 本県沿岸を含む本州北部日本海の来遊量は前年および過去5年平均を下回る見込みです。
- 沖合域の来遊量は前年および過去5年平均を下回る見込みです。

大型クラゲ情報（期間:7月4日～7月24日）

- 今のところ大量出現の兆候はみられません。



石川県周辺海域の水温（期間:7月16日～20日）

■ 沿岸の海面水温 7月20日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は23～24℃台で、過去5年平均との差は-2.0～-1.0℃程度でした。

■ 沿岸観測ブイの水温 今期の水温は24.5～25.1℃で、7月上旬から約1.5℃上昇しました。過去5年平均との差は+0.2～+1.0℃でした。

■ 港内の水温 今期の水温は24.6～26.5℃で、過去5年平均との差は-0.8～+0.6℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値） 単位(℃)

観測位置	日間平均 7/16～7/20	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	休止中	データなし	データなし
②富来沿岸	25.1	-1.1	+1.0
③門前沿岸	24.8	-0.8	+0.8
④曾々木沿岸	24.9	データなし	+0.9
⑤小泊沿岸	24.9	-1.2	+0.2
⑥小浦沿岸	24.9	-1.2	+0.5
⑦鶴川沿岸	24.8	-1.3	+0.4
⑧岸端沿岸	24.5	-1.2	+0.2

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値） 単位(℃)

観測位置	日間平均 7/16～7/20	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	26.5	+0.5	+0.6
⑩宇出津港	24.6	-1.1	+0.1
⑪石崎港	26.5	-1.8	-0.8

日本海スルメイカ長期予報（予報期間:8月～12月）

■ 水産研究・教育機構、並びに本県を含む北海道から鳥取県の7道県の調査船が6月中旬から7月上旬に日本海の48定点でイカ釣り一斉調査を行い、スルメイカの分布や魚体サイズ（外套長）を調べました。水産研究・教育機構が発表した来遊量の見込みの概要は以下のとおりです。

■ **来遊状況** 全調査点の釣機1台1時間当たりの漁獲尾数（CPUE）の平均値が来遊量の指標になります。今年の平均CPUEは0.49尾であり、前年（2.05尾）および過去5年平均（7.87尾）を下回りました。従って、今年の日本海 come 来遊量は前年および過去5年平均を下回っていると考えられます。

■ **分布状況と魚体サイズ** 調査海域の全域でCPUEは低く、スルメイカが高密度に分布する海域はありませんでした。道北・道央では外套長16cm以下、北部日本海では17～20cm台、西部日本海では21cm台以上の個体の割合が高い傾向がみられました。

■ **太平洋側の状況** 10月以降の日本海の漁況に影響する太平洋側のスルメイカの分布状況は前年並みに少ない模様です。

■ **来遊量の見込み** 以上の結果から、8～12月の日本海全体の来遊量（漁獲量）は前年および過去5年平均を下回ると予想されます。海域別の予想は以下のとおりです。

道北・道央: 前年および過去5年平均を下回る。

道南・津軽: 前年並みで、過去5年平均を下回る。

本州北部日本海: 前年および過去5年平均を下回る。

西部日本海: 前年および過去5年平均を下回る。


沖合域: 前年および過去5年平均を下回る。

本予報の詳細については下記URLの資料をご覧ください。


日本海スルメイカ長期漁況予報: https://www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr2023/20230731_srm-n/

太平洋スルメイカ長期漁況予報: https://www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr2023/20230731_srm-t/


今年の漁場一斉調査時のCPUE分布



平均CPUEの経年変化



外套長別の平均CPUE



大型クラゲ情報（期間:7月4日～7月24日）

■ 水産研究・教育機構と漁業情報サービスセンターが7月24日までに発表した大型クラゲに関する情報は以下のとおりです。

日本海 長崎県五島列島の定置網で7月17日に1個体(傘径:60cm)入網しました。

対馬海峡 水産研究・教育機構が7月4日と7月18日に行ったフェリーによる博多・釜山間の目視調査では、大型クラゲは確認されませんでした。

■ 今のところ大量出現の兆候はみられませんが、今後の動向には注意が必要です。水産総合センターでは、大型クラゲの出現情報を収集しています。県内で大型クラゲを見つけたときは当センターにお知らせください。



石川県主要港の水揚げ状況（期間:7月1日～15日）

■ 定置網 サバ・マアジ・アカイカは前年を上回り、マダイは前年並み、トビウオ・フクラギ・コソクラ・サワラ・サゴシは前年を下回りました。サバは486トン水揚げされました。5月から7月前半の累計は767トンで、前年(853トン)を下回り、過去5年平均(382トン)を上回りました。マアジは90トン水揚げされました。5月から7月前半の累計は601トンで、前年(414トン)および過去5年平均(406トン)を上回りました。

■ まき網 サバ・マイワシ・ウルメイワシは前年を下回りました。

■ 底びき網・ごち網 アマエビは前年を上回りました。

■ 刺し網・釣り・その他 マダコは前年並み、ベニズワイガニ・サザエは前年を下回りました。



集計期間 7月1日～7月15日

(単位:トン)

水揚港 魚 種	橋 立	金 沢	富 来	輪 島	珠洲 地区	宇出津	七 尾 地 区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
さば	2.1	4.5	6.7	9.5	185.9	206.3	71.0	486.0	188.3
まあじ	1.0	0.5	2.1	2.1	43.6	27.0	13.2	89.6	65.5
とびうお	0.8	0.1	1.5	9.4	5.3	8.0	5.1	30.1	46.1
ふくらぎ・こぞくら	0.1	0.0	2.5	2.7	2.4	1.8	3.6	13.0	27.6
まだい	0.2	0.0	0.5	0.5	1.4	5.0	2.5	10.1	9.0
さわら・さごし	2.2	0.0	2.8	1.2	0.5	0.6	0.4	7.8	48.7
あかい(カササギ)	2.6	0.2	2.2	0.7	0.3	0.4	0.0	6.4	2.3
しいら			4.1	0.2	0.3	0.2	0.1	4.9	8.3
かわはぎ(カマツラ)	0.1		0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	3.0	5.5
うるめいわし						1.9	0.9	2.8	0.1
その他	1.4	0.5	3.3	2.9	4.4	10.1	13.2	35.8	45.4
合 計	10.5	5.8	26.3	29.8	244.5	261.9	110.6	689.4	447.0
まき網									
さば	—		81.1	50.1		—		131.1	370.5
まいわし	—		94.7			—		94.7	349.4
うるめいわし	—		7.2	0.0		—		7.2	80.1
その他	—		1.9	0.7		—		2.6	199.1
合 計	—	0.0	184.8	50.7	0.0	—	0.0	235.6	999.1
底びき網・ごち網									
あまえび	3.0	22.7					—	25.7	19.0
がすえび(トゲザコエビ 他)	0.0	0.3					—	0.3	0.2
あかがれい		0.1					—	0.1	0.3
なめたがれい(ヒレガリ)	0.0	0.0					—	0.0	0.0
はたはた	0.0	0.0					—	0.0	0.3
その他		0.0					—	0.0	2.8
合 計	3.0	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—	26.1	22.6
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		22.8	15.6	2.4				40.7	61.7
まだこ	0.1			7.2	0.5	3.0	1.4	12.2	12.9
さざえ	0.5		0.9	3.2	0.5	2.4	1.4	8.8	25.7
いわがき	0.1		1.9	3.2		0.0		5.2	1.0
あまだい	0.3	0.0	0.3	1.3	0.3	0.0	0.0	2.2	8.3
めっきだい(キダイ)	0.4	0.1	0.2	0.6	0.1			1.3	4.8
ばいがい	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0		0.0	1.2	1.9
たちうお					0.0	1.0		1.0	2.0
その他	1.4	0.1	1.0	4.2	2.9	3.4	1.6	14.6	117.5
合 計	2.7	24.0	20.0	22.0	4.3	9.9	4.4	87.3	235.8
小型いか釣り									
するめいか		1.3	6.4	0.2	0.7	2.1		10.6	228.6
総 計	16.3	54.1	237.5	102.8	249.4	273.8	115.1	1049.0	1933.1

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

石川県漁海況情報

527号
2023年8月17日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

小型いか釣りの水揚量（期間：5月1日～7月31日）

- 今年の水揚量は前年および過去5年平均を下回りました。
- 魚体サイズは漁期全体では過去5年平均よりも大きめでした。

石川県主要港の水揚状況（期間：7月16～31日）

- まき網ではマイワシが好調でした。



石川県周辺海域の水温（期間：8月1日～5日）

■ 沿岸の海面水温 8月5日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は26～28℃台で、過去5年平均との差は－0.5～＋0.5℃程度でした。

■ 沿岸観測ブイの水温 今期の水温は26.2～28.3℃で、7月中旬から約2.5℃上昇しました。前年同時期との差は－0.9～＋0.8℃、過去5年平均との差は＋0.1～＋2.3℃でした。

■ 港内の水温 今期の水温は27.5～31.0℃で、前年同時期との差は＋0.4～＋0.7℃、過去5年平均との差は＋0.6～＋1.3℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

単位（℃）

観測位置	日間平均 8/1～8/5	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	休止中	データなし	データなし
②富来沿岸	28.3	+0.4	+2.2
③門前沿岸	27.9	+0.8	+2.0
④曾々木沿岸	28.3	データなし	+2.3
⑤小泊沿岸	27.2	-0.3	+1.1
⑥小浦沿岸	27.5	+0.5	+1.0
⑦鵜川沿岸	27.3	+0.4	+0.8
⑧岸端沿岸	26.2	-0.9	+0.1

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）

単位（℃）



観測位置	日間平均 8/1～8/5	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	29.7	+0.7	+1.3
⑩宇出津港	27.5	+0.4	+0.6
⑪石崎港	31.0	+0.7	+1.2

小型いか釣りのスルメイカの水揚量（期間:5月1日～7月31日）

■ 小型いか釣り漁船によるスルメイカの水揚げは終盤を迎えています。5～7月の県内水揚量は235トンで、前年（1,588トン）および過去5年平均（2,279トン）を下回りました。漁海況情報521号では、5～7月の水揚量は過去5年平均並みになると予想しましたが、予想を下回る結果となりました。


■ 20尾入りと25尾入りの銘柄割合は合計56%で、過去5年平均の46%よりも高く、魚体サイズは漁期全体では過去5年平均よりも大きめでした。

■ 5～7月の延べ入港隻数は1,555隻であり、前年（3,322隻）および過去5年平均（4,538隻）を下回りました。今年は前年や前々年と同様に漁場の新潟以北への北上が遅く、7月に入っても本県沿岸で操業が続きましたが、漁期全体を通して入港隻数が少なかったことから、全体の水揚量は過去5年平均を下回りました。




石川県主要港の水揚状況（期間:7月16日～31日）

■ **定置網** サバ・マアジ・トビウオは前年を上回り、マダイ・クロダイは前年並み、サワラ・サゴシ・フクラギ・コゾクラは前年を下回りました。マアジは33トン水揚げされました。5月から7月の累計は636トンで、前年（440トン）および過去5年平均（449トン）を上回りました。



■ **まき網** マイワシ・ウルメイワシは前年を上回り、サバは前年並みでした。マイワシは652トン水揚げされました。5月から7月の累計は1231トンで、前年（1502トン）および過去5年平均（3269トン）を下回りました。



■ **底びき網・ごち網** 沖合底びき網のアマエビは前年を上回りました。

■ **刺網・釣り・その他** ベニズワイガニ・サザエは前年を上回り、ヤナギバチメは前年並みでした。

集計期間 7月16日～7月31日

(単位:トン)

水揚港 魚 種	橋 立	金 沢	富 来	輪 島	珠洲 地区	宇出津	七 尾 地 区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
さば	0.7	3.8	9.4	31.4	16.7	9.5	7.1	78.7	62.6
まあじ	0.3	0.1	4.7	4.1	3.3	9.2	10.8	32.6	26.9
とびうお	0.5	0.0	0.2	5.5	6.4	12.6	5.8	31.0	12.8
さわら・さごし	2.3	0.0	14.3	8.0	0.9	0.9	1.3	27.6	46.7
ふくらぎ・こぞくら	0.2	0.0	6.5	10.4	0.2	2.7	4.0	24.0	42.9
まだい	0.1	0.0	0.5	1.0	0.7	5.5	3.6	11.4	13.8
あかい(ケンキイカ)	1.8	0.0	1.1	1.1	0.3	0.5	0.1	5.0	2.2
くろだい	0.1	0.0	0.3	0.7	0.8	1.2	1.3	4.3	4.2
すずき	0.1	0.1	0.8	1.2	0.6	0.1	0.4	3.1	3.1
かわはぎ(ウツウ)	0.2		1.0	0.8	0.1	0.3	0.5	2.8	4.0
その他	0.6	0.7	5.7	2.1	1.8	7.1	29.5	47.6	87.4
合 計	6.8	4.8	44.4	66.3	31.8	49.6	64.4	268.2	306.5
まき網									
まいわし	—		651.9	0.0		—		651.9	297.4
さば	—		416.0	174.2		—		590.2	735.4
うるめいわし	—		109.1	0.1		—		109.2	66.3
その他	—	149.9	5.3	29.7		—	25.7	210.6	111.9
合 計	—	149.9	1182.3	204.0	0.0	—	25.7	1561.9	1211.1
底びき網・ごち網									
あまえび	2.4	30.4					—	32.8	18.5
はたはた	0.1	0.5					—	0.5	0.1
あかがれい	0.2	0.3					—	0.5	0.5
がすえび(トゲザコエビ他)	0.0	0.4					—	0.4	0.2
なめたがれい(ヒレグロ)	0.0	0.2					—	0.2	0.1
その他	0.0	0.0					—	0.0	1.3
合 計	2.8	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	—	34.6	20.7
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		32.0	29.4	10.8				72.2	46.3
さざえ	1.1		2.3	34.6	1.4	3.3	1.2	43.7	30.9
ふぐ類	0.0		0.1	16.3	0.0	0.0		16.4	3.2
まだこ	0.2			8.2	0.4	2.6	1.6	12.9	10.3
あまだい	0.3	0.2	0.8	7.7	1.0	0.0	0.1	10.0	7.9
やなぎばちめ(ウスマル)	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.5	9.7	10.4
めっきだい(キダイ)	0.3	0.4	0.8	4.0	0.1			5.7	5.1
いわがき	0.9		3.8		0.1	0.0	0.0	4.8	1.2
その他	3.9	1.2	2.5	31.5	2.1	7.0	1.7	49.9	46.7
合 計	6.7	33.8	39.7	122.1	5.1	12.9	5.0	225.3	161.9
小型いか釣り									
するめいか		0.8	12.2	3.4		2.1		18.5	236.7
総 計	16.3	221.0	1278.6	395.9	36.9	64.7	95.2	2108.5	1937.0

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

石川県漁海況情報

528号
2023年8月31日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間:8月18日～24日）

- 日本海中央部のスルメイカの分布量は前年および過去5年平均を上回りました。

調査船白山丸のアマエビ調査結果（期間:7月26日～28日）

- 1歳エビと2歳エビの採捕尾数が多い結果となりました。
- 2023年1～7月の期間におけるアマエビの水揚量は前年同時期を上回りました。

石川県主要港の水揚状況（期間:8月1日～15日）

- 定置網 サバ、マアジは前年並みで、フクラギ・コゾクラ、サワラ・サゴシは前年を下回りました。
- まき網 サバは前年並みでした。
- 刺網・釣り・その他 イワガキ、アカイカは前年を上回り、ベニズワイガニは前年を下回りました。

調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間:8月18日～24日）

■ 調査船白山丸は8月18～24日に日本海中央部から北海道沖でイカ釣り操業を行いました。スルメイカの分布密度の指標であるCPUE（釣機1台1時間当たりの漁獲尾数）は0～28.2尾でした。日本海中央部の平均CPUEは19.6尾であり、前年（5.3尾）および過去5年平均（14.3尾）を上回りました。定点調査ではないため厳密に比較できませんが、今年8月調査時点の日本海中央部のスルメイカの来遊量は前年および過去5年平均を上回っていると考えられます。一方、北海道沖のスルメイカの来遊量は少ないと考えられます。本調査で漁獲したスルメイカの外套長（魚体サイズの指標）の平均値は16.7cmであり、前年（21.9cm）および過去5年平均（21.0cm）より魚体は小型でした。

調査船白山丸イカ釣り調査結果

操業日	操業位置	漁獲尾数	CPUE	外套長範囲(主な魚体)	表面水温	50m水温
8月18日	42-03.8N, 137-21.5E	65	1.03	17～27cm(25cm)	23.9℃	6.22℃
8月19日	43-38.2N, 139-10.9E	0	0		21.5℃	6.48℃
8月20日	42-17.4N, 138-29.4E	10	0.14	10～25cm(11cm)	24.0℃	6.78℃
8月21日	40-04.3N, 136-30.0E	2,013	15.13	12～28cm(16cm)	27.4℃	14.93℃
8月22日	40-04.9N, 135-26.2E	1,835	15.42	11～28cm(14cm)	27.6℃	15.41℃
8月23日	39-20.6N, 135-09.3E	3,944	28.17	11～25cm(16cm)	29.2℃	8.12℃

CPUE: 釣機1台1時間当たりの漁獲尾数、主な魚体: 漁獲尾数の多かったイカの外套長

大型クラゲ情報（期間:7月24日～8月24日）

■ 水産研究・教育機構と漁業情報サービスセンターが8月24日までに発表した大型クラゲに関する情報は以下のとおりです。

日本海 7月25～26日に対馬付近で3個体(傘径:15～20cm)が目視されました。長崎県(対馬)の定置網では、8月21～22日に3個体(傘径:30～80cm)の入網がありました。

対馬海峡 水産研究・教育機構が8月22日に行ったフェリーによる博多・釜山間の目視調査では、2個体(傘径:70cm)が確認されました。

東シナ海 水産研究・教育機構が7月24～29日に行った調査船陽光丸による調査では、目視で1個体(傘径:40cm)が確認されました。

石川県周辺海域の水温（期間:8月16日～20日）

■ **沿岸の海面水温** 8月20日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は27～29℃台で、過去5年平均との差は±0.0～+3.0℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は27.9～28.5℃で、8月上旬から約0.1℃上昇しました。前年同時期との差は+0.1～+0.8℃、過去5年平均との差は+1.0～+2.4℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は28.3～32.2℃で、前年同時期との差は+0.5～+3.6℃、過去5年平均との差は+1.4～+3.7℃でした。

調査船白山丸のアマエビ調査結果(期間:7月26日～28日)

■ 調査船白山丸は7月26～28日に金沢沖の水深375～500mの海域でアマエビ(標準和名:ホッコクアカエビ)の分布量調査を行いました。この調査は、金属枠に袋網をつけた漁具を30分間曳網し、漁獲したアマエビの量や大きさから、今後漁獲対象に成長する小型エビ(若齢エビ)の分布量を調べるもので、夏季と冬季の年2回実施しています。


■ 2歳(2021年生まれ)の1曳網当たりの採捕尾数は447尾と多く、同年級群が漁獲対象に成長する2025年以降に漁獲が上向くと予想されます。1歳(2022年生まれ)の1曳網当たりの採捕尾数も455尾と多く、2025年に続き2026年も良好な漁獲加入が期待できます。

■ 県内主要港の2023年1～7月のアマエビ水揚量は479トン(前年同期比105%)でした。

夏季調査におけるアマエビの年齢別採捕尾数(尾/網)

調査年	1歳	2歳	3歳
2013年	29	163	168
2014年	33	291	129
2015年	503	111	89
2016年	67	412	44
2017年	135	257	380
2018年	111	354	322
2019年	110	118	54
2020年	70	282	102
2021年	14	182	117
2022年	367	79	205
2023年	455	447	126

単位(トン) 県内主要港におけるアマエビ漁獲量
(1月～7月)の推移




集計期間 8月1日～8月15日

(単位:トン)

水揚港 魚 種	橋 立	金 沢	富 来	輪 島	珠洲 地区	宇出津	七 尾 地 区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
さば	0.2	0.2	0.2	0.3	3.0	7.5	8.0	19.3	21.5
ふくらぎ・こそくら	0.1	0.1	7.7	4.4	0.6	1.5	4.1	18.6	34.6
まあじ	0.1	0.3	2.0	1.0	1.0	6.5	6.1	17.0	16.8
さわら・さごし	3.3	0.0	3.2	0.7	0.0	0.9	0.8	9.0	15.9
うるめいわし			0.4		0.1	0.3	6.6	7.4	1.1
まだい	0.0	0.0	0.3	0.5	0.4	2.1	4.2	7.3	5.7
しいら	0.0	0.0	1.7	0.1	0.1	0.0	0.4	2.4	8.0
くろだい	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.5	0.7	1.9	1.7
とびうお	0.1	0.0	0.0	0.3	0.5	0.3	0.4	1.7	1.3
かわはぎ(ウヅラ)	0.2		0.5	0.3	0.1	0.2	0.4	1.6	2.0
その他	0.7	0.4	2.1	2.2	1.1	4.7	38.7	49.9	59.2
合 計	4.8	1.1	18.2	10.0	7.0	24.5	70.5	136.2	167.8
まき網									
さば	—	0.0	217.0	95.8		—		312.9	337.8
ぶり	—	60.6		0.1		—	8.4	69.1	86.2
うるめいわし	—			0.0		—		0.0	0.4
その他	—	0.8	49.9	27.2		—		77.9	36.0
合 計	—	61.5	267.0	123.1	0.0	—	8.4	460.0	460.3
底びき網・ごち網									
あまえび		2.7					—	2.7	0.7
がすえび(トゲザエビ他)		0.1					—	0.1	0.0
なめたがれい(ヒレグロ)		0.0					—	0.0	0.0
あかがれい		0.0					—	0.0	0.0
その他							—	0.0	0.4
合 計	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	—	2.8	1.1
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		11.2	19.5	0.0				30.7	43.8
さざえ	0.8		1.5	0.0	0.7	2.6	1.5	7.1	18.6
まだこ	0.0			1.9	0.1	1.0	1.0	4.0	4.2
いわがき	0.6		1.8		0.1	0.0	0.0	2.5	1.5
あかがれい						2.0		2.0	2.3
あかい(ケンサキ)	0.7	0.0	0.0	0.4		0.1		1.3	0.0
あからばちめ(ハツメ)				1.1				1.1	0.7
なめらばちめ(キジハ)	0.1		0.2	0.0	0.1	0.4	0.2	0.9	0.7
その他	1.1	0.8	1.0	1.8	1.0	4.0	1.7	11.4	18.3
合 計	3.3	12.0	24.1	5.2	2.0	10.2	4.3	61.2	90.2
小型いか釣り									
するめいか			1.8	0.8				2.6	132.9
総 計	8.1	77.4	311.0	139.1	9.1	34.7	83.2	662.7	852.2

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

石川県漁海況情報



529号
2023年9月19日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

大型クラゲ情報（期間:8月25日～9月8日）

- 石川県周辺海域での確認情報はありませんでした。

石川県主要港の水揚げ状況（期間:8月16日～31日）

- まき網ではサバが前年を上回りました。



石川県周辺海域の水温（期間:9月3日～7日）

■ 沿岸の海面水温 9月5日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は28℃台で、過去5年平均との差は+1.0～+2.0℃程度でした。

■ 沿岸観測ブイの水温 今期の水温は27.9～29.3℃で、8月中旬から約0.8℃上昇しました。前年同時期との差は+0.6～+2.4℃、過去5年平均との差は+1.0～+2.7℃でした。

■ 港内の水温 今期の水温は29.4～31.0℃で、前年同時期との差は+1.6～+3.4℃、過去5年平均との差は+2.1～+3.3℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

単位(℃)

観測位置	日間平均 9/3～9/7	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	27.9	+0.6	+1.0
②富来沿岸	28.5	+1.7	+1.8
③門前沿岸	28.2	+1.7	+1.5
④曾々木沿岸	28.1	データなし	+1.9
⑤小泊沿岸	29.1	+2.1	+2.7
⑥小浦沿岸	29.3	+2.4	+2.7
⑦鶴川沿岸	29.2	+2.2	+2.3
⑧岸端沿岸	29.2	+2.1	+2.4

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）

単位(℃)

観測位置	日間平均 9/3～9/7	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	29.5	+1.6	+2.1
⑩宇出津港	29.4	+2.2	+2.8
⑪石崎港	31.0	+3.4	+3.3

大型クラゲ情報（期間:8月25日～9月8日）

■ 水産研究・教育機構と漁業情報サービスセンターが9月8日までに発表した大型クラゲに関する情報は以下のとおりです。

日本海 山口県三島沖で操業する底曳網で、9月1日、2日、5日に1～3個体（傘径：60～100cm）の入網が確認されました。広島大学が9月3日に行ったフェリーによる隠岐海峡（七類・西郷間）の目視調査では、大型クラゲの出現は確認されませんでした。

対馬海峡 水産研究教育機構が9月5日に行ったフェリーによる博多・釜山間の目視調査では、大型クラゲの出現は確認されませんでした。

■ 水産研究・教育機構が8月30日に発表した大型クラゲ調査のとりまとめ結果によると、今年の東シナ海における大型クラゲの発生量は昨年より少なく、日本周辺海域への出現は極めて少量にとどまっています。移動予測計算によると、今後、大型クラゲは日本海沖合を北上し、少量が10月中旬に津軽海峡に達するものの、隠岐諸島以东の沿岸域にはほとんど出現しないものと予測されています。




石川県主要港の水揚げ状況（期間:8月16日～31日）

■ **定置網** カタクチイワシ・マダイは前年を上回り、シイラ・カマスは前年並み、サバ・フクラギ・コゾクラ・マアジは前年を下回りました。フクラギ・コゾクラは31トン水揚げされました。5月から8月までの累計は336トンであり、前年（531トン）および過去5年平均（605トン）を下回りました。マアジは14トン水揚げされました。5月から8月までの累計は676トンであり、前年（477トン）および過去5年平均（496トン）を上回りました。

■ **まき網** ガンド・サバ・マイワシは前年を上回りました。サバは470トン水揚げされました。5月から8月までの累計は3,481トンであり、前年（2,710トン）および過去5年平均（1,619トン）を上回りました。

■ **底びき網・ごち網** アマエビ・ガスエビは前年並みでした。

■ **刺網・釣り・その他** サザエは前年並み、ベニズワイガニは前年を下回りました。




集計期間 8月16日～8月31日

(単位:トン)

水揚港 魚種	橋立	金沢	富来	輪島	珠洲 地区	宇出津	七尾 地区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
さば	0.0	1.4	0.2	1.6	35.8	0.1	18.5	57.6	122.3
しいら	0.1		39.8	2.6	1.0		3.0	46.4	49.4
ふくらぎ・こぞくら	0.1	0.1	5.8	9.2	0.3	0.5	15.4	31.4	53.1
まあじ	0.0	0.0	0.8	1.7	6.8	0.4	4.6	14.3	19.6
うるめいわし			0.3				13.9	14.2	36.0
かたくちいわし							11.9	11.9	4.3
かます			0.2	0.1	0.1	0.0	4.5	4.9	4.9
まだい	0.0		0.1	0.2	0.5	0.2	1.5	2.4	1.7
あおりいか	0.0		0.2	0.1	0.1	0.0	1.7	2.0	1.3
さわら・さごし	0.6	0.0	0.6	0.1	0.3		0.1	1.7	6.7
その他	0.5	0.1	3.1	2.5	0.7	1.1	4.9	12.8	17.8
合 計	1.4	1.7	51.0	18.1	45.6	2.2	79.9	199.8	317.3
まき網									
がんど	—	0.2	772.3			—		772.5	157.8
さば	—	107.5	208.2	103.3	30.3	—	21.0	470.3	240.6
まいわし	—		63.6			—	0.0	63.6	0.0
その他	—	10.4	43.0	15.4	0.0	—	4.7	73.5	74.6
合 計	—	118.0	1087.1	118.7	30.3	—	25.7	1379.9	472.9
底びき網・ごち網									
あまえび		2.7					—	2.7	3.3
がすえび(トゲザコヒ [※] 他)		0.1					—	0.1	0.1
なめたがれい(ヒレク [※] 他)		0.1					—	0.1	0.1
あかがれい		0.1					—	0.1	0.1
はたはた		0.0					—	0.0	0.0
その他		0.0					—	0.0	1.5
合 計	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	—	2.9	5.1
刺網・釣り・その他									
さざえ	0.1		2.5	23.0	0.3	1.2	0.2	27.2	30.9
べにずわいがに			18.2	7.7				25.9	56.9
あまだい	0.2	0.1	0.2	5.1	0.3	0.0	0.0	6.0	4.9
あからばちめ(ハツメ)				4.7				4.7	1.8
めっきだい(キタイ)	0.4	0.4	0.1	3.4	0.1			4.5	3.4
ふぐ類			0.0	3.9	0.0	0.0		4.0	1.6
かわはぎ(ウマヅ [※] ウ)	0.0	0.0	3.5	0.4	0.0	0.0	0.0	3.9	1.9
いわがき	0.0		3.7			0.0	0.0	3.8	0.1
その他	2.1	0.3	2.5	15.4	1.1	5.9	2.0	29.3	24.7
合 計	2.9	0.9	30.6	63.6	1.9	7.1	2.2	109.2	126.3
小型いか釣り									
するめいか			8.0	20.6	1.8			30.5	174.4
総 計	4.2	123.6	1176.7	221.0	79.6	9.4	107.9	1722.4	1095.9

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

石川県漁海況情報



530号

2023年9月29日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>

携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間:9月9日～14日）

- 日本海中央部のスルメイカの分布量は前年並みで、過去5年平均を下回りました。

アオリイカの漁況の見通し（予報期間:9月～12月）

- 定置網によるアオリイカ水揚げ量は196トンと予測され、過去5年平均を上回る見込みです。

石川県主要港の水揚げ状況（期間:9月1日～15日）

- 定置網ではフクラギ・コゾクラ・シイラが前年を上回り、まき網ではガンドが前年を上回りました。



石川県周辺海域の水温（期間:9月16日～20日）

■ **沿岸の海面水温** 9月20日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は26～27℃台でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は27.9～28.6℃で、9月上旬から約0.2℃低下しました。前年同時期との差は+1.1～+2.8℃、過去5年平均との差は+2.0～+2.6℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は28.6～29.8℃で、前年同時期との差は+1.0～+1.9℃、過去5年平均との差は+2.2～+2.8℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

単位(℃)

観測位置	日間平均 9/16～9/20	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	休止中	データなし	データなし
②富来沿岸	28.1	+2.6	+2.6
③門前沿岸	27.9	+2.8	+2.6
④曾々木沿岸	28.0	データなし	+2.3
⑤小泊沿岸	28.0	+1.1	+2.0
⑥小浦沿岸	28.3	+1.2	+2.3
⑦鶴川沿岸	28.6	+1.4	+2.1
⑧岸端沿岸	28.6	+1.4	+2.5

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）

単位(℃)

観測位置	日間平均 9/16～9/20	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	28.7	+1.9	+2.6
⑩宇出津港	28.6	+1.2	+2.2
⑪石崎港	29.8	+1.0	+2.8

調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間：9月9日～14日）

■ 調査船白山丸は9月9日～14日に日本海中央部でイカ釣り調査を行いました。スルメイカの分布密度の指標であるCPUE（釣機1台1時間当たりの漁獲尾数）は4.9～21.9尾でした。今回調査の平均CPUEは9.9尾であり、前年同時期平均（8.6尾）並みで、過去5年平均（13.6尾）を下回りました。定点調査でないため厳密には比較できませんが、今期の日本海中央部のスルメイカの分布量は前年並みで、過去5年平均を下回っていると考えられます。本調査のスルメイカの外套長（魚体サイズの指標）の平均値は19.2cmであり、前年（21.0cm）および過去5年平均（20.7cm）より小さめでした。

調査船白山丸イカ釣り調査結果

操業日	操業位置	漁獲尾数	CPUE	外套長範囲(主な魚体)	表面水温	50m水温
9月09日	38-20.6N, 134-46.7E	518	4.9	14～29cm(18cm)	26.8℃	16.8℃
9月10日	38-12.2N, 132-05.1E	3,219	21.9	14～28cm(18cm)	24.7℃	10.6℃
9月11日	38-24.0N, 133-01.7E	1,132	8.1	16～27cm(20cm)	26.4℃	19.1℃
9月12日	39-13.8N, 134-05.7E	915	6.7	16～27cm(19cm)	26.7℃	17.3℃
9月13日	39-28.6N, 135-04.0E	1,006	8.0	15～28cm(18cm)	24.4℃	12.1℃

CPUE: 釣機1台1時間当たりの漁獲尾数、主な魚体: 漁獲尾数の多かったイカの外套長


アオリイカの漁況の見通し（予報期間：9月～12月）

■ アオリイカは日本海側では青森県以南の沿岸域に分布し、水温の季節変動にあわせて、春に北上し、秋に南下します。石川県では南下期の個体が漁獲対象となっており、9～12月に主に定置網で漁獲されます。

■ 9～12月の定置網による水揚量と9月上旬の能登半島東部沿岸の水温の間に

は正の相関関係が認められ、水温が高いほど水揚量が多い傾向がみられます。今年の水温は29.1℃であり、この値を水温と水揚量の関係式に当てはめると、今年9～12月の定置網による水揚量は196トンと推定され、前年（103トン）および過去5年平均（107トン）を上回ると予想されます。

単位(トン) 9～12月の定置網によるアオリイカ水揚量



石川県主要港の水揚げ状況（期間：9月1日～15日）

■ 定置網 フクラギ・コゾクラ・シイラは前年を上回り、マアジ・アオリイカは前年並み、サバは前年を下回りました。

■ まき網 ガンドは前年を上回り、サバは前年を下回りました。

■ 底びき網・ごち網 ハタハタは前年を上回り、ニギス・アマエビは前年並みでした。

■ 刺網・釣り・その他 ベニズワイガニ・サザエは前年を下回りました。


集計期間 9月1日～9月15日

(単位:トン)

水揚港 魚 種	橋 立	金 沢	富 来	輪 島	珠洲 地区	宇出津	七 尾 地 区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
ふくらぎ・こぞくら	0.2	0.3	7.0	3.9	0.9	0.2	103.9	116.4	39.0
しいら	0.1	0.0	23.4	5.2	0.8	0.1	14.0	43.7	30.1
さば	0.7	0.8	0.2	0.2	12.2	0.1	12.9	27.1	41.2
さわら・さごし	1.9	0.7	15.7	0.5	0.2		0.2	19.2	6.0
まあじ	0.0	0.1	2.8	1.3	7.5	0.7	2.5	15.0	15.4
かます			0.5	0.1	0.7	0.1	12.3	13.8	11.3
あおりいか	0.0	0.0	0.4	0.3	0.1	0.1	3.7	4.7	5.7
かじき類	0.0	0.0	1.9	0.5			0.2	2.6	2.1
かながしら			1.6					1.6	0.2
うるめいわし			0.1				1.3	1.4	8.2
その他	0.6	0.2	2.5	2.1	1.2	0.3	8.4	15.3	13.2
合 計	3.6	2.1	56.1	14.3	23.6	1.6	159.4	260.8	172.5
まき網									
がんど	—	74.2	167.6	5.2		—	18.4	265.3	57.9
さば	—		112.7	34.8		—		147.5	353.1
ふくらぎ・こぞくら	—	0.3	7.9	32.2		—	8.4	48.8	21.4
その他	—	13.2	8.1	5.1		—	0.0	26.4	72.2
合 計	—	87.6	296.2	77.3	0.0	—	26.8	487.9	504.7
底びき網・ごち網									
にぎす	5.9	22.6	21.2	7.2	2.1	1.7	—	60.8	67.6
あまえび	10.5	22.5		3.0	0.1		—	36.1	41.4
はたはた	0.0			0.2	10.0	1.3	—	11.5	4.9
めっきだい(キダイ)	3.5	3.9	0.1	1.5			—	9.1	6.3
すがれい(ムサガレイ)	1.3	0.4	0.0	3.7	0.0		—	5.4	3.0
あかがれい	1.3	3.1	0.5	0.4	0.1		—	5.4	10.0
がすえび(トゲザコヒ 他)	0.5	4.1	0.0	0.2	0.1		—	4.9	4.9
あんこう	2.2	0.3	0.0	2.0			—	4.5	4.5
みずうお(ノダノゲ)	0.2	2.6		0.1	0.1		—	3.0	3.3
のどぐろ(アカムツ)	0.7	0.4		1.7	0.0		—	2.8	2.7
その他	6.0	5.1	3.4	12.1	2.3		—	28.9	70.9
合 計	32.1	65.0	25.3	32.1	14.9	3.1	—	172.4	219.6
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに			12.6	0.0				12.6	39.9
あからばちめ(ハツメ)				3.6				3.6	1.6
さざえ			1.0	0.0	0.1	0.4	0.1	1.7	25.4
あかがれい						1.2		1.2	0.8
まだい	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	1.1	1.4
あまだい	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	1.1	2.4
めっきだい(キダイ)	0.3	0.4	0.1	0.3	0.1			1.1	1.8
のどぐろ(アカムツ)	0.2		0.0	0.1	0.0	0.6	0.1	1.0	2.0
その他	0.4	0.4	1.2	2.6	0.3	3.1	1.5	9.6	22.7
合 計	1.0	0.9	15.2	7.3	0.8	6.1	1.8	33.0	98.0
小型いか釣り									
するめいか			1.9	45.5	14.4			61.9	131.1
総 計	36.7	155.6	394.7	176.4	53.7	10.8	188.0	1015.9	1125.9

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

石川県漁海況情報



531号

2023年10月19日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>

携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

夏季水温の長期変化と今夏の特徴（期間：7月～9月）

- 近年、県沿岸地先・七尾湾の夏季水温は上昇傾向にあり、今夏は過去最高となりました。

フクラギの漁況の見通し（予報期間：10月～11月）

- 10～11月の水揚量は129トン程度と見込まれ、前年および過去5年平均並みと予想されます。

夏季水温の長期変化と今夏の特徴（期間：7月～9月）

■ 水産総合センターでは、海洋環境の変化を把握するために本県周辺海域で水温観測を行っています。夏季（7～9月）の沿岸水温の長期変化と今夏の特徴は以下のとおりです。

■ 外浦側の橋立漁港（加賀市）と志賀町（赤住）地先、内浦側の宇出津港（能登町）と石崎漁港（七尾市）の夏季水温（深度1.5m）は2000年代以降、上昇する傾向にあり、今夏はいずれの調査点でも平年より2～3℃ほど高く、1980年代以降では過去最高を記録しました。

■ 七尾湾の北湾・西湾・南湾の代表観測点の夏季水温（水面から海底付近までの平均値）も2000年代以降、上昇する傾向にあり、今夏はいずれの湾でも過去最高となりました。

■ 水深の浅い沿岸や七尾湾の水温は気候の影響を特に受けやすく、今夏については記録的な猛暑により水温が大きく上昇したものと考えられます。

石川県沿岸の夏季（7～9月）水温の長期変化

	地先水温（℃）								七尾湾水温（℃）					
	橋立漁港		志賀町		宇出津港		石崎漁港		北湾		西湾		南湾	
	水温	偏差	水温	偏差	水温	偏差	水温	偏差	水温	偏差	水温	偏差	水温	偏差
1980年代	25.1	-0.8	—	—	25.2	-0.3	25.4	-1.0	25.0	-0.3	25.5	-0.7	25.1	-0.3
1990年代	25.9	0.0	24.6	-0.5	25.1	-0.3	26.0	-0.4	24.1	-1.2	25.0	-1.2	24.8	-0.5
2000年代	25.5	-0.4	24.6	-0.5	25.3	-0.2	26.1	-0.3	24.2	-1.1	25.4	-0.8	24.8	-0.6
2010年代	26.4	0.5	25.6	0.6	25.8	0.4	27.3	0.9	25.7	0.4	26.7	0.5	25.5	0.2
2020年	26.5	0.6	25.9	0.8	25.9	0.5	27.0	0.6	25.5	0.2	26.3	0.1	25.6	0.2
2021年	26.8	0.9	25.5	0.4	25.8	0.4	28.1	1.7	25.3	0.0	26.4	0.2	25.4	0.1
2022年	27.2	1.3	26.3	1.3	26.6	1.1	28.2	1.8	26.6	1.3	27.8	1.6	—	—
2023年	28.0	2.1	27.3	2.2	27.4	1.9	29.5	3.2	27.8	2.5	29.0	2.8	27.9	2.5


※1980年以降の夏季平均水温（平年値）と各年水温の差を偏差とした

※1990年代と2000年代の七尾湾については、欠測が多いものの長期傾向の参考として値を示した

フクラギの漁況の見通し（予報期間:10月～11月）

■ 今年生まれたブリ幼魚は本県では7月頃からボウズやコゾクラと呼ばれるサイズで定置網に入網し始め、10月頃にはフクラギと呼ばれるサイズに成長します。今年7～9月の主要10港の定置網によるフクラギの水揚げ量は179トン（速報値）であり、過去5年平均（205トン）並みでした。

水揚げ量(トン) 定置網のフクラギ水揚げ量(10～11月)



■ 10～11月のフクラギの水揚げ量については、11月1日時点の能登半島北西沖の50m深水温が低い年ほど多い傾向がみられ、今年の水温は過去5年平均より高いと予測されています。水温と水揚げ量の関係式から、10～11月の水揚げ量は129トンと見積もられ、前年（111トン）および過去5年平均（149トン）並みと予想されます。


石川県周辺海域の水温（期間:10月1日～5日）

■ 沿岸の海面水温 10月5日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は24～25℃台で、過去5年平均との差は+0.5℃～+1.5℃程度でした。

■ 沿岸観測ブイの水温 今期の水温は25.7～26.1℃で、9月下旬から約1.1℃低下しました。前年同時期との差は+0.9～+1.7℃、過去5年平均との差は+1.6～+2.0℃でした。

■ 港内の水温 今期の水温は25.1～26.2℃で、前年同時期との差は-1.0～+1.2℃、過去5年平均との差は+0.7～+1.6℃でした。

石川県周辺の海面水温



石川県主要港の水揚げ状況（期間:9月16日～30日）

■ 定置網 サワラ・サゴシ・フクラギ・コゾクラは前年を上回り、サバ・カマスは前年並み、マアジは前年を下回りました。

■ まき網 フクラギ・コゾクラは前年を上回り、サバは前年を下回りました。

■ 底びき網・ごち網 ニギスは前年並み、アマエビ・アカガレイは前年を下回りました。

■ 刺網・釣り・その他 サザエは前年並み、ベニズワイガニは前年を下回りました。


集計期間 9月16日～9月30日

(単位:トン)

水揚港 魚 種	橋 立	金 沢	富 来	輪 島	珠洲 地区	宇出津	七 尾 地 区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
さわら・さごし	0.6	2.9	148.0	27.5			1.1	180.2	30.4
ふくらぎ・こぞくら	0.1	0.0	2.0	3.0		0.2	77.8	83.2	56.8
さば	0.4	1.8	2.0	19.6		0.0	11.8	35.7	43.3
しいら	0.1	0.0	2.8	8.0		0.0	14.5	25.4	30.3
かます	0.0		0.3	0.8		0.1	22.0	23.2	24.0
まあじ	0.1	0.0	0.5	2.1		0.6	3.5	6.7	13.4
かじき類	0.1		1.5	1.2		0.1	3.6	6.5	1.2
あおりいか	0.0	0.0	0.5	0.3		0.1	3.5	4.6	5.3
かながしら			1.5					1.5	0.3
ひらまさ	0.0	0.0	0.3	0.9		0.0	0.1	1.3	0.2
その他	0.4	0.1	1.9	2.1		0.3	6.0	10.8	30.7
合 計	1.8	4.9	161.5	65.4	0.0	1.3	144.0	379.0	235.8
まき網									
さば	—	29.9	378.1	10.0		—		418.0	1370.3
ふくらぎ・こぞくら	—	0.1	1.8	195.3		—		197.2	2.1
がんど	—	91.9		13.3		—	43.7	148.9	230.8
その他	—	12.0	56.6	3.9		—	1.1	73.6	274.2
合 計	—	133.9	436.5	222.5	0.0	—	44.8	837.7	1877.5
底びき網・ごち網									
にぎす	0.4	17.0	14.3	7.0	1.8		—	40.4	43.6
あまえび	4.4	16.5	0.2	5.8	0.0		—	26.9	41.8
みずうお(ノゲンゲ)	0.2	5.3		0.2	0.0		—	5.8	5.8
すがれい(ムシガレイ)	1.0	0.5		3.0	0.0		—	4.5	4.3
あんこう	1.1	0.3		2.4	0.0		—	3.9	3.4
やりいか	1.2	1.8	0.0	0.9	0.0		—	3.8	0.1
あかがれい	0.8	2.1	0.5	0.1	0.1		—	3.7	7.7
がすえび(トゲザコヒ 他)	0.3	3.1	0.0	0.1	0.1		—	3.6	6.6
めっきだい(キダイ)	1.4	0.2	0.1	1.5			—	3.2	7.1
のどぐろ(アカムツ)	0.3	0.6	0.0	2.0	0.1		—	3.1	2.5
その他	3.1	2.6	2.5	14.5	1.6	0.2	—	24.4	73.2
合 計	14.2	50.0	17.7	37.4	3.8	0.2	—	123.3	196.0
刺網・釣り・その他									
さざえ			0.5	19.6	0.0	0.3	0.1	20.6	24.2
べにずわいがに			10.1	7.7				17.8	54.8
あまだい	0.3	0.0	0.3	2.0	0.1	0.1	0.0	2.8	3.3
やなぎばちめ(ウスマハル)			0.0	2.0	0.0	0.0	0.4	2.4	4.4
めっきだい(キダイ)	0.4	0.2	0.5	0.9	0.0			2.0	3.5
ふぐ類				1.6	0.0			1.6	1.3
のどぐろ(アカムツ)	0.1			1.1	0.0	0.2	0.0	1.6	2.5
あからばちめ(ハツメ)				1.6				1.6	4.7
その他	0.5	0.2	0.8	8.1	0.2	3.5	1.5	14.9	32.0
合 計	1.4	0.4	12.2	44.7	0.5	4.1	2.0	65.3	130.7
小型いか釣り									
するめいか			2.7	32.4	31.4	0.1		66.5	29.3
総 計	17.5	189.2	630.5	402.4	35.7	5.7	190.8	1471.7	2469.4

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

石川県漁海況情報



532号

2023年11月2日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>

携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間：10月10日～15日）

- 日本海中央部のスルメイカの分布量は前年および過去5年平均を下回りました。
- 魚体サイズは前年並みで、過去5年平均よりやや大きめでした。

大型クラゲ情報（期間：9月6日～10月26日）

- 今年は大型クラゲの出現は少なく、今後、漁業被害を与える出現はほぼ起こらないと考えられます。



石川県周辺海域の水温（期間：10月16日～20日）

■ 沿岸の海面水温 10月20日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は19～23℃台で、過去5年平均との差は-2.0～+1.0℃程度でした。

■ 沿岸観測ブイの水温 今期の水温は23.3～23.5℃で、10月上旬から約1.9℃低下しました。前年同時期との差は+1.2～+1.4℃、過去5年平均との差は+1.0～+1.6℃でした。

■ 港内の水温 今期の水温は22.1～24.0℃で、前年同時期との差は+0.5～+1.7℃、過去5年平均との差は+1.3～+1.5℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

単位(℃)

観測位置	日間平均 10/16～10/20	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	23.4	データなし	+1.4
②富来沿岸	23.3	+1.3	+1.3
③門前沿岸	23.4	+1.4	+1.4
④曾々木沿岸	23.3	データなし	+1.6
⑤小泊沿岸	23.3	+1.2	+1.0
⑥小浦沿岸	23.5	+1.2	+1.0
⑦鶴川沿岸	23.5	+1.2	+1.0
⑧岸端沿岸	休止中	データなし	データなし

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）

単位(℃)

観測位置	日間平均 10/16～10/20	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	22.7	+1.3	+1.3
⑩宇出津港	24.0	+1.7	+1.5
⑪石崎港	22.1	+0.5	+1.3

調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間:10月10日～15日）

■ 調査船白山丸は10月10～15日に日本海中央部でイカ釣り調査を行いました。スルメイカの分布密度の指標であるCPUE（釣機1台1時間当たりの漁獲尾数）は0.2～8.7尾でした。今回調査の平均CPUEは3.8尾で、前年（5.8尾）および過去5年平均（9.2尾）を下回りました。定点調査ではないため厳密に比較できませんが、今期の日本海中央部のスルメイカの分布量は前年および過去5年平均を下回っていると考えられます。本調査のスルメイカの外套長（魚体サイズの指標）の平均値は21.8cmであり、過去5年平均（21.1cm）よりやや大きく、前年（22.2cm）並みでした。なお、今年度の白山丸によるスルメイカ漁場調査は今航海で終了となります。

調査船白山丸イカ釣り調査結果

操業日	操業位置	漁獲尾数	CPUE	外套長範囲(主な魚体)	表面水温	50m水温
10月10日	37-24.5N, 133-02.9E	150	1.4	18～29cm (21cm)	23.6℃	18.31℃
10月11日	38-09.8N, 132-28.9E	1,464	8.7	18～28cm (20cm)	22.0℃	17.31℃
10月12日	38-44.5N, 134-05.7E	22	0.2	18～29cm (21cm)	22.6℃	19.55℃
10月13日	38-45.9N, 135-22.0E	43	0.3	18～32cm (22cm)	22.8℃	20.29℃
10月14日	39-38.4N, 136-29.0E	1,188	8.5	18～30cm (21cm)	19.8℃	13.23℃

CPUE: 釣機1台1時間当たりの漁獲尾数、主な魚体: 漁獲尾数の多かったイカの外套長

大型クラゲ情報（期間:9月6日～10月26日）

■ 水産研究・教育機構と漁業情報サービスセンターが10月26日までに発表した大型クラゲに関する情報は以下のとおりです。

■ 対馬海峡付近の底曳網では散発的な入網がみられ、鳥取県沖、石川県沖の底曳網でも数個体の入網が確認されました。長崎県、京都府、青森県の定置網で数個体の入網が確認されました。

■ 水産研究・教育機構が行ったフェリーによる博多・釜山間の目視調査（9月20日）と練習船による日本海中部での目視・採集調査（9月6～14日）、広島大学が行ったフェリーによる小樽・舞鶴間の目視調査（9月14日・10月4日）では、大型クラゲは確認されませんでした。

■ 今年は大型クラゲの出現が非常に少なく、今後、漁業被害を与える沿岸域への出現はほぼ起こらないと考えられます。

石川県主要港の水揚げ状況（期間:10月1日～15日）

■ 定置網 サバ・シイラは前年を上回り、サワラ・サゴシ・カマス・マアジは前年を下回りました。

■ まき網 サバ・マアジは前年を上回りました。

■ 底びき網・ごち網 ニギス・アマエビは前年並みでした。

■ 刺網・釣り・その他 ベニズワイガニ・アオリイカは前年並みでした。

■ 小型いか釣り スルメイカは前年を上回りました。

集計期間 10月1日～10月15日

(単位:トン)

水揚港 魚種	橋立	金沢	富来	輪島	珠洲 地区	宇出津	七尾 地区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
さば	0.4	1.7	159.6	10.4	0.2	1.8	17.7	191.7	26.7
しいら		0.0	1.7	6.3	3.3	2.0	99.8	113.2	20.2
ふくらぎ・こぞくら	0.1	0.2	2.3	8.7	0.1	1.0	34.5	46.8	55.5
さわら・さごし	0.6	0.9	15.2	13.8	0.1	1.4	3.0	35.0	71.4
かます	0.1		0.2	0.6	0.4	0.2	17.9	19.3	38.4
まあじ	0.1	1.9	1.1	0.9	0.2	0.7	4.3	9.1	19.5
あおりいか	0.1	0.0	0.5	0.9	0.0	0.3	2.2	4.1	4.8
かじき類	0.0	0.0	0.2	0.7	0.0	0.2	3.0	4.1	1.0
うるめいわし							4.1	4.1	4.0
がんど			0.9	0.2		0.1	1.0	2.1	6.4
その他	0.6	0.9	2.3	4.5	0.3	1.9	10.4	20.8	34.8
合 計	2.0	5.6	183.8	47.0	4.7	9.6	197.7	450.4	282.6
まき網									
さば	—	0.1	232.2	41.6		—		273.9	41.9
がんど	—	157.9		0.3		—	34.7	192.8	166.6
まあじ	—		155.5			—		155.5	7.2
その他	—	1.4	7.4	70.3		—		79.0	43.6
合 計	—	159.4	395.1	112.1	0.0	—	34.7	701.3	259.3
底びき網・ごち網									
にぎす	1.0	18.7	9.7	4.4	0.2	0.4	—	34.5	32.9
あまえび	5.2	16.9	0.5	5.6	0.6		—	28.8	28.8
やりいか	2.5	3.3	0.0	1.2	0.0		—	7.0	0.2
あんこう	0.9	0.6	0.1	2.7	0.0		—	4.2	2.2
みずうお(ノロゲンゲ)	0.8	3.0		0.1	0.2		—	4.0	2.5
がすえび(トゲザコビ他)	0.4	3.0	0.0	0.2	0.3		—	3.8	3.5
すがれい(ムシガレイ)	0.7	0.7	0.0	2.3	0.0		—	3.8	1.3
あかがれい	1.4	1.3	0.2	0.3	0.0		—	3.2	1.8
のどぐろ(アカムツ)	0.5	0.3	0.0	2.0	0.0		—	2.9	2.2
くちぼそがれい(マカレイ)	0.1	0.0		2.5	0.0		—	2.6	2.7
その他	5.1	2.5	1.0	14.1	1.2	1.4	—	25.3	24.8
合 計	18.5	50.2	11.4	35.4	2.6	1.8	—	120.0	103.0
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		22.0	11.6	5.8				39.4	37.1
あおりいか			0.0	0.2	0.1	1.0	0.5	1.8	1.7
あからばちめ(ハツメ)				1.5				1.5	0.6
まだい	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.7	0.0	0.9	1.7
さわら・さごし			0.0	0.6	0.2	0.1	0.0	0.9	0.4
あかがれい						0.9		0.9	1.0
めっきだい(キダイ)	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0			0.9	2.0
やなぎばちめ(ウスマール)			0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.7	3.5
その他	1.1	0.3	0.9	1.7	0.8	2.2	1.4	8.6	17.0
合 計	1.8	22.5	12.8	10.3	1.2	5.0	2.2	55.6	64.9
小型いか釣り									
するめいか			0.3	15.9	25.8	1.3		43.3	9.7
総 計	22.3	237.8	603.5	220.7	34.1	17.7	234.5	1370.6	719.6

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

石川県漁海況情報



533号

2023年11月17日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>

携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

寒ブリの漁況の見通し（予報期間：11月～来年3月）

- 定置網による寒ブリの水揚げ量は前年並みで、過去10年平均を上回ると予想されます。

ズワイガニの水揚げ初日の結果速報

- 加能ガニ（雄ガニ）の水揚げ量は前年を下回り、香箱ガニ（雌ガニ）の水揚げ量は前年を上回りました。



石川県周辺海域の海面水温（期間：11月1日～5日）

■ **沿岸の海面水温** 11月5日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は19～22℃台で、過去5年平均との差は-0.5～+2.0℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は21.6～21.7℃で、10月下旬から約0.7℃低下しました。前年同時期との差は+1.0～+1.4℃で、過去5年平均との差は+1.1～+1.3℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は20.0～22.2℃で、前年同時期との差は+1.3～+2.0℃、過去5年平均との差は+1.5～+2.0℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

単位(℃)

観測位置	日間平均 11/1～11/5	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	21.7	データなし	+1.3
②富来沿岸	21.6	+1.2	+1.2
③門前沿岸	21.7	+1.4	+1.3
④曾々木沿岸	21.7	データなし	+1.3
⑤小泊沿岸	21.7	+1.1	+1.2
⑥小浦沿岸	21.7	+1.0	+1.1
⑦鶴川沿岸	21.7	+1.0	+1.2
⑧岸端沿岸	休止中	データなし	データなし

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）

単位(℃)


観測位置	日間平均 11/1～11/5	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	21.3	+2.0	+2.0
⑩宇出津港	22.2	+1.3	+1.6
⑪石崎港	20.0	+1.4	+1.5

寒ブリの漁況の見通し（予報期間:11月～来年3月）

■ 本県の寒ブリ漁は11月後半頃に始まり、12～1月に盛漁期を迎えます。県内主要10港の定置網による寒ブリ（11～3月に漁獲される体重4kg以上のブリ）の水揚量は来遊状況により大きく変動し、昨年漁期は過去10年平均を上回りました。

■ 寒ブリの水揚量は、2年前のガンド（2kg以上4kg未満のブリ）の年間水揚量が多く、また、南下期（12月）の能登半島東方および佐渡島北東の100m深水温が高いほど多くなる傾向にあり、その関係式から寒ブリの水揚量を予測することができます。

■ 2年前のガンドの水揚量は平年並みでした。海況数値モデルによると、今年12月の能登半島東方の100m深水温は平年より高め、佐渡島北東の100m深水温は平年並みと予想されています。これらの情報を前述の関係式にあてはめると、今期の寒ブリの水揚量は545トンと見積もられ、前年（573トン）並みで、過去10年平均（451トン）を上回ると予想されます。



ズワイガニの水揚げ初日の結果速報

■ 11月6日にズワイガニ漁が解禁されましたが、今年は悪天候のため出漁できず、11月9日にかなざわ総合市場および橋立港で初競りが行われました。

■ 加能ガニ（雄のズワイガニ）の最高級ブランド「輝（かがやき）」は、かなざわ総合市場で1尾が認定され、香箱ガニ（雌のズワイガニ）の最高級ブランド「輝姫（かがやきひめ）」は、両市場で計6尾が認定されました。



「輝」に認定された加能ガニ

■ 両市場の初日の合計水揚量は、加能ガニ:11.0トン、香箱ガニ:33.0トンでした。加能ガニは前年（12.0トン）を下回りましたが、香箱ガニは前年（29.1トン）を上回りました。

石川県主要港の水揚げ状況（期間:10月16日～31日）

■ 定置網 シイラ・サワラ・サゴシ・サバは前年を上回り、アオリイカは前年並み、カマス・マアジは前年を下回りました。

■ まき網 マアジは前年を上回り、サバは平年並み、ブリは前年を下回りました。

■ 底びき網・ごち網 アマエビ・ニギスは前年を下回りました。

■ 刺網・釣り・その他 ベニズワイガニは前年を上回り、ヤナギバチメは前年を下回りました。

集計期間 10月16日～10月31日

(単位:トン)

水揚港 魚 種	橋 立	金 沢	富 来	輪 島	珠洲 地区	宇出津	七 尾 地 区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
しいら	0.0		2.0	4.8	25.1	24.1	187.2	243.1	27.8
さわら・さごし	3.6	2.4	95.0	23.1	11.7	6.0	5.6	147.4	36.3
さば	0.9	1.8	0.5	53.9	38.6	10.8	6.5	112.9	68.8
ふくらぎ・こぞくら	0.7	0.0	13.5	20.8	2.4	1.3	8.7	47.4	34.1
うるめいわし			0.1	0.0	2.6	6.9	15.8	25.4	0.1
かます	0.0		0.0	0.4	3.6	2.8	16.4	23.2	47.7
まあじ	0.7	2.2	0.5	3.1	4.1	2.0	4.6	17.2	38.3
まいわし					4.6	7.4	0.3	12.4	0.0
そうだがつお	0.1		0.8	0.2	2.4	3.0	2.6	9.1	21.2
あおりいか	0.7	0.1	1.1	1.2	0.6	0.8	2.7	7.0	7.9
その他	1.7	0.3	2.7	3.3	3.7	12.0	18.1	41.9	55.0
合 計	8.4	6.8	116.1	110.8	99.4	77.0	268.5	687.0	337.2
まき網									
さば	—		229.1	206.9		—		436.0	377.9
まあじ	—		205.5	20.9		—		226.4	76.3
ぶり	—	100.1	0.0	8.9		—	16.1	125.2	216.4
その他	—	76.9	18.9	89.0		—	18.0	202.8	447.3
合 計	—	177.0	453.5	325.8	0.0	—	34.1	990.4	1117.9
底びき網・ごち網									
にぎす	1.2	21.7	17.5	7.5	5.4	2.7	—	56.0	70.5
あまえび	8.9	24.1	1.0	10.7	4.5		—	49.2	73.2
やりいか	3.7	8.2	0.0	2.5	0.0		—	14.4	3.0
あんこう	1.3	0.6	0.2	4.4	0.5		—	7.0	5.9
すがれい(ムシガレイ)	1.2	1.2	0.0	4.3	0.3		—	6.9	5.3
がすえび(トゲザコエビ 他)	0.7	3.3	0.0	0.4	1.0		—	5.3	5.9
くちぼそがれい(マガレイ)	0.2	0.1	0.0	4.7	0.1		—	5.1	3.8
のどぐろ(アカツ)	0.3	0.3	0.1	3.7	0.3		—	4.7	3.3
みずうお(ノボリツグ)	1.0	2.9		0.3	0.3		—	4.5	8.1
するめいか	0.5	0.8	0.1	2.4	0.5		—	4.4	4.4
その他	9.1	6.3	2.4	23.5	4.1	0.3	—	45.8	52.3
合 計	28.1	69.4	21.4	64.3	16.9	3.1	—	203.2	235.4
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		50.1	26.5	8.8				85.4	70.1
やなぎばちめ(ウメバル)			0.0	6.8	0.0	0.0	0.4	7.3	13.3
あからばちめ(ハツメ)				4.2				4.2	3.2
あまだい	0.8	0.1	0.4	2.2	0.1	0.1	0.0	3.7	2.8
まだい	0.1	0.0	0.3	2.0	0.2	0.5	0.1	3.3	4.5
がんど			0.1	2.7	0.0	0.0	0.0	2.8	2.0
めつきだい(キタイ)	0.9	0.2	0.2	1.2	0.0			2.5	3.1
のどぐろ(アカツ)				2.3		0.0	0.0	2.3	3.2
その他	0.9	0.7	0.9	14.8	1.6	3.3	2.1	24.3	32.1
合 計	2.7	51.1	28.5	45.0	1.9	4.0	2.6	135.8	134.3
小型いか釣り									
するめいか			0.3	1.7	2.4	1.1		5.4	13.9
総 計	39.2	304.4	619.9	547.5	120.6	85.1	305.2	2021.9	1838.7

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

石川県漁海況情報



534号

2023年12月1日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>

携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

ズワイガニの水揚げ状況（期間：11月6日～22日）

- 水揚げ量は、雄ガニでは過去5年平均を下回り、雌ガニでは過去5年平均を上回りました。
- 出漁隻日当たりの水揚げ量は、雄ガニでは過去5年平均を下回り、雌ガニでは過去5年平均を上回りました。

フクラギの漁況の見通し（予報期間：12月～来年3月）

- 12月～来年3月の水揚げ量は88トンと見込まれ、前年および過去5年平均を下回ると予想されます。



石川県周辺海域の海面水温（期間：11月16日～20日）

■ 沿岸の海面水温 11月20日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は17～20℃台で、過去5年平均との差は-2.0～+1.5℃程度でした。

■ 沿岸観測ブイの水温 今期の水温は19.0～20.0℃で、11月上旬から約1.9℃低下しました。前年同時期との差は-0.5～+0.6℃、過去5年平均との差は+0.1～+0.8℃でした。

■ 港内の水温 今期の水温は16.7～20.3℃で、前年同時期との差は+0.1～+1.1℃、過去5年平均との差は±0.0～+1.0℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

単位（℃）

観測位置	日間平均 11/16～11/20	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	19.7	+0.6	+0.6
②富来沿岸	19.0	-0.5	+0.1
③門前沿岸	19.6	データなし	+0.6
④曾々木沿岸	19.8	データなし	+0.8
⑤小泊沿岸	19.7	+0.6	+0.6
⑥小浦沿岸	19.9	+0.6	+0.7
⑦鶴川沿岸	20.0	+0.6	+0.8
⑧岸端沿岸	休止中	データなし	データなし

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）



単位（℃）

観測位置	日間平均 11/16～11/20	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	18.0	+0.4	+0.3
⑩宇出津港	20.3	+1.1	+1.0
⑪石崎港	16.7	+0.1	-0.0

ズワイガニの水揚げ状況（期間：11月6日～22日）

■ ズワイガニ漁解禁の11月6日から11月22日までの県内主要港における水揚げ量は、加能ガニ（雄ガニ）：32.9トン（前年同期比58%、過去5年平均比57%）、香箱ガニ（雌ガニ）：89.9トン（前年同期比93%、過去5年平均比126%）でした。

■ 同期間における出漁隻日当たりの水揚げ量は、加能ガニ：139.8kg/隻日（前年同期比91%、過去5年平均比82%）、香箱ガニ：382.8kg/隻日（前年同期比148%、過去5年平均比180%）でした。




フクラギの漁況の見通し（予報期間：12月～来年3月）

■ 2023年10月19日発行の漁海況情報531号では、10～11月（盛漁期）のフクラギの水揚げ量の見通しをお知らせしました。今回は引き続き、12～3月（越冬期）の見通しをお知らせします。

■ 12～3月の水揚げ量は1月の能登半島北西沖の200m深水温が低いほど多

い傾向がみられます。海況数値モデルによると、1月の能登半島北西沖の200m深水温は過去5年平均より高くなると予想されています。水温と水揚げ量の関係式から、12～3月の水揚げ量は88トンと見積もられ、前年（125トン）および過去5年平均（196トン）を下回ると予想されます。



石川県主要港の水揚げ状況（期間：11月1日～15日）

■ **定置網** サワラ・サゴシ・シイラ・フクラギ・コゾクラは前年を上回り、サバは前年並み、ブリ・マアジは前年を下回りました。

■ **まき網** ガンドは前年を上回り、サバは前年を下回りました。

■ **底びき網・ごち網** コウバコは前年並み、ズワイガニ・アカガレイ・アマエビは前年を下回りました。

■ **刺網・釣り・その他** ベニズワイガニ・ヤナギバチメは前年を下回り、フクラギ・コゾクラは前年並みでした。

集計期間 11月1日～11月15日

(単位:トン)

水揚港 魚種	橋立	金沢	富来	輪島	珠洲 地区	宇出津	七尾 地区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
さわら・さごし	1.6	0.1	118.2	16.8	3.3	11.1	7.4	158.5	34.8
しいら			1.7	0.4	7.8	37.4	89.7	137.1	25.4
さば	0.4	0.2	0.1	19.0	32.4	11.6	5.4	69.0	63.2
ふくらぎ・こぞくら	0.3	0.1	15.8	18.2	0.9	0.9	2.8	39.1	12.4
かます	0.0		0.1	0.1	0.7	7.8	21.6	30.3	11.2
ぶり	0.3		0.1	0.1	0.1	12.7	3.5	16.7	26.0
まあじ	0.4	0.4	0.7	2.1	4.7	4.0	2.9	15.3	19.3
うるめいわし				0.0	0.1	9.3	4.9	14.4	0.7
あおりいか	0.2	0.2	0.5	1.7	0.8	1.5	4.4	9.3	17.8
そうだがつお			0.4	0.2	2.3	3.6	2.0	8.5	24.0
その他	1.1	0.1	2.1	7.6	2.6	8.1	18.6	40.2	42.5
合 計	4.3	1.0	139.6	66.3	55.7	108.2	163.3	538.4	277.2
まき網									
がんど	—	103.3		0.0		—	26.4	129.7	67.6
さば	—	30.5		8.7		—		39.2	198.0
ふくらぎ・こぞくら	—	0.9		10.3		—		11.2	4.3
その他	—	0.8		3.9		—		4.7	44.7
合 計	—	135.5	0.0	22.9	0.0	—	26.4	184.8	314.6
底びき網・ごち網									
ずわいがに雌(香箱がニ)	11.9	28.4	4.9	23.8	5.1		—	74.0	72.7
ずわいがに雄(加能がニ)	5.1	7.4	1.2	5.7	3.1		—	22.5	36.2
あかがれい	1.8	2.0	0.4	1.9	0.0		—	6.1	7.9
にぎす	1.1				2.3	0.2	—	3.6	15.3
あまえび	0.5		0.2	0.9	1.5		—	3.0	10.4
ばいがい	0.6	0.7	0.1	1.1	0.1		—	2.6	4.9
なめたがれい(ヒレがロ)	0.2	0.1	0.1	1.4	0.1		—	1.9	2.4
そうはち	0.1		0.0	0.8	0.2		—	1.1	1.1
やりいか	0.9				0.0		—	0.9	1.0
あんこう	0.5				0.1		—	0.7	1.7
その他	3.0	0.1	0.5	2.0	1.5	0.9	—	8.0	24.8
合 計	25.8	38.6	7.5	37.5	14.0	1.1	—	124.5	178.4
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		28.0	5.2	0.0				33.2	74.8
やなぎばちめ(ウヌマル)				0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	6.1
さざえ			0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.9	2.4
かわはぎ(ウツラ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	3.3
ふくらぎ・こぞくら			0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.6	0.2
あおりいか			0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	1.0
くろばんちょ(メナ)							0.5	0.5	0.4
すずき	0.0		0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.4	0.7
その他	0.4	0.1	0.3	1.3	0.7	0.8	1.1	4.7	28.5
合 計	0.4	28.2	5.7	2.7	2.2	1.5	2.0	42.6	117.3
小型いか釣り									
するめいか				0.4	1.6	0.1		2.1	7.1
総 計	30.5	203.3	152.8	129.7	73.5	110.9	191.6	892.3	894.6

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

石川県漁海況情報



535号

2023年12月15日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>

携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

スルメイカの漁況の見通し（予報期間：来年1月～3月）

- 定置網によるスルメイカの水揚量は362トン程度で、過去5年平均並みと予想されます。

石川県主要港の水揚状況（期間：11月16日～30日）

- 定置網ではシイラ・サワラ・サゴシが前年を上回りました。



石川県周辺海域の海面水温（期間：12月1日～5日）

■ 沿岸の海面水温 12月5日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は16～18℃台であり、過去5年平均との差は－0.5～＋1.5℃程度でした。

■ 沿岸観測ブイの水温 今期の水温は17.8～18.2℃で、11月下旬から約0.8℃低下しました。前年同時期との差は－0.1～±0.0℃、過去5年平均との差は＋0.3～＋0.4℃でした。

■ 港内の水温 今期の水温は13.7～17.6℃で、前年同時期との差は－1.6～－0.5℃、過去5年平均との差は－0.1～±0.0℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

単位（℃）

観測位置	日間平均 12/1～12/5	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	休止中	データなし	データなし
②富来沿岸	休止中	データなし	データなし
③門前沿岸	休止中	データなし	データなし
④曽々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	17.8	－0.1	＋0.3
⑥小浦沿岸	18.2	－0.0	＋0.4
⑦鶴川沿岸	18.2	＋0.0	＋0.4
⑧岸端沿岸	休止中	データなし	データなし

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）

単位（℃）

観測位置	日間平均 12/1～12/5	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	15.7	－0.6	±0.0
⑩宇出津港	17.6	－0.5	－0.1
⑪石崎港	13.7	－1.6	＋0.0


スルメイカの漁況の見通し（予報期間：来年1月～3月）

■ スルメイカには秋生まれ群と冬生まれ群があり、冬に定置網で漁獲されるスルメイカは主に冬生まれ群です。定置網による水揚量は年変動が大きく、これには水温が関係しています。

■ 過去21年間の1～3月の水揚量と1月の50m深水温の関係を調べたところ、能登半島北沖の平均水温が低いほど、水揚量が多い傾向がみられました。海況数値モデル（水産研究・教育機構）によると、来年1月の能登沖の50m深平均水温は過去5年平均を下回ると予測されています。

■ 過去21年間の1～3月の水揚量と1月の50m深水温の関係から、来年1～3月の定置網による水揚量を予測したところ、362トンと見積もられ、前年（162トン）を上回り、過去5年平均（338トン）並みになると予想されます。

単位(トン) 1～3月の定置網によるスルメイカ水揚量



石川県主要港の水揚状況（期間：11月16日～30日）


■ **定置網** シイラ・ソウダガツオ・フクラギ・コゾクラ・サワラ・サゴシは前年を上回り、アオリイカは前年並み、サバ・ブリは前年を下回りました。シイラは74トン水揚げされました。シイラの8～11月の合計は754トンで、前年（241トン）および過去5年平均（327トン）を上回りました。サワラ・サゴシは23トン水揚げされました。サワラ・サゴシの8～11月の合計は642トンで、前年（213トン）を上回り、過去5年平均（591トン）並みでした。

■ **まき網** フクラギ・コゾクラは前年を上回り、サバ・ガンドは前年を下回りました。


■ **底びき網・ごち網** 香箱ガニ（雌のズワイガニ）・加能ガニ（雄のズワイガニ）はともに前年を上回り、ニギス・アマエビは前年並み、アカガレイは前年を下回りました。アマエビは8トン水揚げされました。アマエビの9～11月の合計は155トンで、前年（205トン）および過去5年平均（198トン）を下回りました。

■ **刺網・釣り・その他** ベニズワイガニ・マダラは前年を下回りました。


定置網のシイラ水揚量



定置網のサワラ・サゴシ水揚量



底びき網のアマエビ水揚量



集計期間 11月16日～11月30日

(単位:トン)

水揚港 魚種	橋立	金沢	富来	輪島	珠洲 地区	宇出津	七尾 地区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
しいら				0.1	3.2	19.7	50.7	73.6	49.4
そうだがつお				0.0	0.3	22.1	30.4	52.8	7.8
さば				1.3	23.5	7.1	13.5	45.4	102.7
ぶり			0.0	0.0	2.6	31.9	7.7	42.2	60.5
ふくらぎ・こぞくら			0.1	2.5	0.7	2.9	26.2	32.4	8.8
まあじ	0.0		0.0	0.6	8.0	5.0	9.3	22.9	17.4
さわら・さごし			0.0	3.1	6.5	4.4	8.8	22.8	11.2
あおりいか			0.0	0.2	1.5	7.9	12.1	21.8	21.0
くろばんちょ(メヅナ)					0.0	0.8	10.6	11.5	6.9
ふぐ類			0.0	0.0	0.9	0.6	7.0	8.5	25.6
その他	0.0		0.4	1.6	2.9	6.8	20.2	31.8	193.4
合 計	0.0	0.0	0.5	9.5	50.1	109.2	196.5	365.8	504.6
まき網									
さば	—	24.4				—		24.4	118.2
ふくらぎ・こぞくら	—	18.6				—	0.0	18.7	0.7
がんど	—	9.0				—	1.0	10.1	26.5
その他	—	3.0				—		3.0	63.9
合 計	—	55.0	0.0	0.0	0.0	—	1.1	56.1	209.3
底びき網・ごち網									
ずわいがに雌(香箱ガニ)	9.5	26.0	2.9	22.1	3.8		—	64.3	37.8
ずわいがに雄(加能ガニ)	11.8	11.0	3.6	9.8	7.1		—	43.4	34.2
にぎす			14.0				—	14.0	13.5
あまえび	0.0		4.6	3.4			—	8.0	9.1
あかがれい	1.1	3.3	0.9	1.0	0.2		—	6.6	11.2
ばいがい	0.9	2.7	0.6	1.5	0.6		—	6.2	8.5
なめたがれい(ヒレガロ)	0.0	0.1	0.2	1.8	0.1		—	2.2	2.1
がすえび(トゲザコエビ 他)	0.2	0.1	0.6	0.2	0.1		—	1.3	1.2
みずうお(ノボナゲ)	0.0		0.4	0.5			—	0.9	0.6
まだら	0.0	0.1	0.0	0.6	0.2		—	0.9	4.0
その他	0.8	0.2	0.9	1.7	0.4	1.2	—	5.2	14.1
合 計	24.3	43.5	28.8	42.7	12.5	1.2	—	152.9	136.4
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		36.2	14.4	7.7				58.3	81.2
まだら				39.2				39.2	72.1
くろばんちょ(メヅナ)							1.1	1.1	0.5
あまだい	0.4			0.6	0.0	0.1		1.0	2.3
かわはぎ(ウマヅラ)	0.0	0.1		0.1	0.8	0.0		1.0	2.6
ふくらぎ・こぞくら		0.0	0.4	0.0	0.1	0.4	0.1	1.0	0.1
さざえ			0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.9	1.7
やなぎばちめ(ウスメバル)				0.7	0.0	0.0	0.1	0.8	4.0
その他	0.5	0.1	0.5	4.1	0.5	1.0	1.3	8.0	26.4
合 計	0.9	36.3	15.3	52.5	1.7	1.9	2.6	111.3	190.9
小型いか釣り									
するめいか				6.7	5.8	0.0		12.6	18.1
総 計	25.2	134.9	44.6	111.4	70.2	112.3	200.2	698.7	1059.3

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

石川県漁海況情報



536号

2023年12月28日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>

携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

石川県主要港の水揚げ状況（期間：12月1日～15日）

- 定置網のブリは前年を上回りました。11月からの累計は前年を上回りました。
- 底びき網のズワイガニ雄（加能ガニ）とズワイガニ雌（香箱ガニ）は前年を上回りました。
解禁日からの累計は、加能ガニでは前年並みで、香箱ガニでは前年を上回りました。



石川県周辺海域の海面水温（期間：12月15日～19日）

■ 沿岸の海面水温 12月19日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は13～17℃台で、過去5年平均との差は-2.0～+2.0℃程度でした。

■ 沿岸観測ブイの水温 今期の水温は16.1～16.4℃で、12月上旬から約1.3℃低下しました。前年同時期との差は-0.2～±0.0℃、過去5年平均との差は-0.1～+0.2℃でした。

■ 港内の水温 今期の水温は12.6～16.5℃で、前年同時期との差は+0.2～+1.1℃、過去5年平均との差は+0.5～+1.2℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

単位(℃)

観測位置	日間平均 12/15～12/19	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	休止中	データなし	データなし
②富来沿岸	休止中	データなし	データなし
③門前沿岸	休止中	データなし	データなし
④曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	16.1	-0.0	+0.2
⑥小浦沿岸	16.4	-0.1	+0.0
⑦鶴川沿岸	16.3	-0.2	-0.1
⑧岸端沿岸	休止中	データなし	データなし

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）

単位(℃)

観測位置	日間平均 12/15～12/19	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	15.1	+1.1	+1.2
⑩宇出津港	16.5	+0.6	+0.5
⑪石崎港	12.6	+0.2	+0.7


石川県主要港の水揚げ状況（期間:12月1日～15日）

■ **定置網** プリ・シイラ・ソウダガツオ・フグ類・フクラギ・コゾクラは前年を上回り、スズキは前年並み、アオリイカ・マアジ・サバは前年を下回りました。プリは210トン水揚げされました。11月からの累計は273トンで、前年（150トン）および過去5年平均（113トン）を上回りました。アオリイカは15トン水揚げされました。9月からの累計は68トンで、前年（91トン）および過去5年平均（96トン）を下回りました。サワラ・サゴシは6トン水揚げされました。9月からの累計は634トンで、前年（206トン）を上回り、過去5年平均（609トン）並みでした。


■ **底びき網・ごち網** ズワイガニ雄（加能ガニ）、ズワイガニ雌（香箱ガニ）・アマエビ・ニギスは前年を上回りました。加能ガニは27トン水揚げされました。解禁日から累計は94トンで、前年（81トン）および過去5年平均（87トン）並みでした。香箱ガニは44トン水揚げされました。解禁日から累計は183トンで、前年（123トン）および過去5年平均（88トン）を上回りました。

■ **刺網・釣り・その他** ベニズワイガニ・マダラ・スルメイカは前年を上回りました。ベニズワイガニは66トン水揚げされました。8月からの累計は393トンで、前年（512トン）を下回り、過去5年平均（397トン）並みでした。


定置網のプリ水揚げ量




定置網のアオリイカ水揚げ量




定置網のサワラ・サゴシ水揚げ量




底びき網のズワイガニ雄(加能ガニ)水揚げ量



簗のベニズワイガニ水揚げ量



底びき網のズワイガニ雌(香箱ガニ)水揚げ量



集計期間 12月1日～12月15日

(単位:トン)

水揚港 魚種	橋立	金沢	富来	輪島	珠洲 地区	宇出津	七尾 地区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
ぶり			0.1		2.1	153.3	54.7	210.1	63.4
しいら					0.7	32.4	82.0	115.1	24.2
そうだがつお					0.6	9.9	40.4	50.9	9.4
あおりいか					0.4	5.3	9.7	15.4	28.1
まあじ			0.0		0.3	4.0	6.8	11.2	21.3
さば					0.6	5.4	4.2	10.2	38.9
ふぐ類			0.0		1.4	2.0	5.7	9.1	7.2
ふくらぎ・こぞくら			0.7		0.6	2.3	4.2	7.8	2.9
すずき			1.8		1.2	1.9	2.7	7.6	8.9
くろばんちょ(メヅナ)			0.0		0.0	0.5	5.8	6.3	11.2
その他			0.8		1.4	9.4	28.0	39.6	202.6
合 計	0.0	0.0	3.5	0.0	9.3	226.4	244.3	483.4	418.3
まき網									
ふくらぎ・こぞくら	—	60.8				—	1.9	62.7	0.0
ぶり	—	33.0				—	1.2	34.3	0.7
がんど	—	3.5				—	0.1	3.6	0.0
その他	—	0.2				—	0.0	0.2	0.0
合 計	—	97.6	0.0	0.0	0.0	—	3.2	100.8	0.8
底びき網・ごち網									
ずわいがに雌(香箱ガニ)	5.3	21.5	2.1	14.1	1.4		—	44.3	12.3
ずわいがに雄(加能ガニ)	9.2	6.2	1.1	7.6	3.2		—	27.2	10.2
あまえび	0.5	3.1	20.1	2.9	0.0		—	26.6	8.9
にぎす			18.8				—	18.8	11.0
がすえび(トゲザコエビ 他)	0.2	0.9	6.3	0.2	0.0		—	7.6	1.6
あかがれい	1.3	2.9	0.7	1.9	0.1		—	7.0	3.2
ばいがい	0.9	2.7	0.2	1.6	0.2		—	5.6	3.3
みずうお(ノロゲソウ)		0.3	3.6	0.6	0.0		—	4.5	0.9
そうはち	0.0	0.1		1.6	0.0		—	1.7	0.9
まだら	0.0	0.1	0.1	1.6	0.0		—	1.7	1.5
その他	0.9	0.7	2.5	1.9	0.2	0.9	—	7.2	5.1
合 計	18.3	38.4	55.4	34.0	5.2	0.9	—	152.3	58.9
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		44.0	17.7	4.7				66.5	42.2
まだら				20.0		0.0		20.1	0.1
ふぐ類			0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	2.1	0.1
あからばちめ(ハツメ)				1.5				1.5	0.0
ふくらぎ・こぞくら	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1.0	0.1	1.3	0.1
さざえ			0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	1.2	0.6
さば				0.9			0.0	0.9	0.0
さわら・さごし			0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4
その他	0.5	0.2	0.3	5.1	1.3	2.2	2.5	12.1	13.9
合 計	0.5	44.2	19.0	34.6	1.7	3.6	2.9	106.5	57.3
小型いか釣り									
するめいか				30.1	7.6			37.7	6.0
総 計	18.8	180.2	77.9	98.7	23.8	230.9	250.4	880.6	541.3

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

石川県漁海況情報



537号

2024年2月7日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>

携帯電話 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

地先水温のまとめ(期間:2023年1月～12月)

- 橋立漁港・志賀町地先・宇出津新港・石崎漁港の水温は年間を通じて「かなり高め」でした。

定置網の年間水揚げ状況のまとめ(期間:2023年1月～12月)

- 昨年の水揚げ重量は前年・過去10年平均並みで、水揚げ額は前年・過去10年平均を上回りました。
- 昨年の産地価格指数は前年・過去10年平均を上回りました。


石川県周辺海域の海面水温(期間:1月21日～25日)

■ 沿岸の海面水温 1月25日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は13～14℃台であり、過去5年平均との差は±0.0～+1.0℃程度でした。

■ 沿岸観測ブイの水温 今期の水温は12.5～13.0℃で、1月中旬から約0.6℃低下しました。前年同時期との差は-0.4℃～-0.2℃、過去5年平均との差は-0.2～±0.0℃でした。

■ 港内の水温 今期の水温は10.7～11.3℃で、前年同時期との差は±0.0～+0.1℃、過去5年平均との差は±0.0～+0.7℃でした。

石川県周辺の海面水温



地先水温のまとめ(期間:2023年1月～12月)

■ 外浦側の橋立漁港(加賀市)および志賀町(赤住)地先、内浦側の宇出津新港(能登町)および石崎漁港(七尾市)の昨年の月別平均水温と平年差は以下のとおりでした。ここでは、水温の高低をその発生頻度で評価しており、2年に1回程度のを「平年並み」、4年に1回程度のを「やや～」、10年に1回程度のを「かなり～」、20年に1回程度のを「はなはだ～」としています。

■ 冬季(1～3月) 全体の平均水温は11.5℃、平年差は+1.2℃で、「かなり高め」でした。外浦側では「やや高め」～「かなり高め」、内浦側では「かなり高め」～「はなはだ高め」でした。

■ 春季(4～6月) 全体の平均水温は17.5℃、平年差は+1.0℃で、「かなり高め」でした。外浦側および内浦側ともに「やや高め」～「かなり高め」でした。

■ 夏季(7～9月) 全体の平均水温は28.0℃、平年差は+2.2℃で、「かなり高め」でした。外浦側では「かなり高め」、内浦側では「かなり高め」～「はなはだ高め」でした。

■ **秋季(10～12月)** 全体の平均水温は18.8℃、平年差は+1.5℃で、「かなり高め」でした。外浦側では「かなり高め」、内浦側では「かなり高め」～「はなはだ高め」となりました。

2023年の地先水温と平年差

	橋立漁港 (℃)			志賀町地先 (℃)			宇出津新港 (℃)			石崎漁港 (℃)		
	2023年	平年値	平年差	2023年	平年値	平年差	2023年	平年値	平年差	2023年	平年値	平年差
1月	11.7	10.9	0.8	10.9	10.6	0.3	13.7	12.6	1.0	11.1	8.9	2.2
2月	10.5	9.9	0.6	9.6	9.4	0.2	12.1	10.9	1.1	9.7	8.7	1.1
3月	12.4	10.7	1.7	11.1	10.0	1.1	12.0	10.5	1.6	12.8	10.1	2.7
4月	14.3	13.1	1.1	13.1	12.1	0.9	13.3	11.7	1.6	14.7	13.3	1.4
5月	17.6	17.0	0.6	16.3	16.0	0.4	16.3	15.3	1.0	18.8	17.4	1.4
6月	21.7	20.8	0.9	21.2	19.7	1.5	20.5	19.7	0.7	22.9	22.1	0.8
7月	26.3	25.2	1.1	25.3	24.1	1.2	24.4	23.7	0.7	27.0	25.6	1.5
8月	29.9	27.6	2.3	29.0	26.6	2.4	29.1	27.0	2.1	32.4	28.6	3.8
9月	27.8	25.2	2.6	27.4	24.5	2.9	28.5	25.6	2.9	29.2	25.9	3.4
10月	22.7	21.3	1.4	22.3	20.8	1.5	24.3	22.3	2.1	22.1	21.0	1.1
11月	18.9	17.3	1.6	18.3	17.0	1.3	20.6	18.8	1.8	17.6	15.7	1.8
12月	14.6	13.6	1.0	14.2	13.4	0.8	17.1	15.5	1.6	13.0	11.5	1.5

平年値: 過去30年の平均水温

定置網の年間水揚げ状況のまとめ (期間:2023年1月～12月)


■ 2023年の県内主要港(橋立・金沢・富来・輪島・蛸島・鵜飼・松波・宇出津・七尾地区)の定置網による水揚げの概要は以下のとおりです。

■ **水揚げ重量** 2023年の水揚げ重量は20,311トンで、前年(20,107トン)の101%、過去10年平均(18,786トン)の108%でした。過去10年平均に比べて、ブリ・サバなどが増加し、スルメイカ・フクラギ・コゾクラ・マアジなどが減少しました。

■ **水揚げ金額** 2023年の水揚げ金額は51.9億円で、前年(40.1億円)の129%、過去10年平均(37.9億円)の137%でした。過去10年平均に比べて、サワラ・サゴシ・スルメイカなどが減少したものの、ブリ・マイワシが増加しました。

■ **産地価格** 水揚げ金額の多い上位40銘柄について、1995年を100とする産地価格指数を計算したところ、2023年の指数は83.5で、前年(81.9)および過去10年平均(64.5)を上回りました。過去10年平均と比較するとサバなどの単価は低下したものの、マアジ・マイワシ・フクラギ・コゾクラ・スルメイカなど多くの主要魚種で単価が上昇しました。

定置網の水揚げ重量・金額・価格指数



お知らせ 令和6年能登半島地震の影響により、主要産地市場から水産総合センターへの漁獲量データの送信が一部停止しています。県内主要港の水揚げ状況については、漁獲量データの送信がある程度復旧するまで休止します。

石川県漁海況情報



538号

2024年3月27日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>

携帯電話 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

寒ブリの水揚げ状況(期間:11月～2月)

- 11月～2月の水揚げ量は1,337トンで、前年および過去10年平均を上回りました。

底びき網漁業の年間水揚げ状況のまとめ(期間:2023年1月～12月)

- 昨年の水揚げ重量は前年並みで過去10年平均を下回り、水揚げ金額は前年並みで過去10年平均を上回りました。
- 昨年の産地価格指数は前年並みで過去10年平均を上回りました。

石川県主要港の水揚げ状況(期間:2月16日～29日)

- 定置網ではマイワシが1995年以降で4番目の水揚げ量でした。


石川県周辺海域の海面水温(期間:3月1日～5日)

■ 石川県周辺の海面水温 3月5日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は13～15℃台であり、過去5年平均との差は+1.0～+4.0℃程度でした。

■ 沿岸観測ブイの水温 今期の小泊・小浦・鶴川の水温は10.7～11.0℃で、2月下旬から約0.3℃低下しました。前年同時期との差は-0.3℃～±0.0℃で、過去5年平均との差はいずれも-0.1℃でした。


■ 港内の水温 今期の橋立港・石崎港の水温は9.5～10.6℃で、前年同時期との差は-2.0～-0.6℃、過去5年平均との差は-1.1～-0.7℃でした。

石川県周辺の海面水温



寒ブリの水揚げ状況(期間:11月～2月)

■ 寒ブリ(定置網で漁獲された4kg以上のブリ)の水揚げ量は、11～12月に695トン、1～2月に642トンの計1,337トンで、前年(388トン)および過去10年平均(405トン)を上回りました。今期は12月初旬から豊漁が続いており、2月までの水揚げ量は1995年以降では、2010年に次いで2番目に多くなっています。



底びき網の年間水揚状況のまとめ(期間:2023年1月～12月)




■ 2023年の県内主要港(橋立・金沢・富来・輪島・蛸島・鵜飼・宇出津)の沖合底びき網漁業と小型底びき網漁業による水揚げの概要は以下のとおりです。

■ **水揚重量と水揚金額** 2023年の水揚重量は3,785トンで、前年(3,891トン)の97%、過去10年平均(4,486トン)の84%でした。過去10年平均に比べて、ズワイガニ雌(香箱ガニ)・ホッケなどが多く、ハタハタ・マダラなどが少なくなりました。2023年の水揚金額は40.6億円であり、前年(37.4億円)の108%、過去10年平均(35.8億円)の113%でした。過去10年平均に比べて、アマエビ・ニギス・ホッケ・スルメイカなどで多く、ハタハタ・マダラなどで少なくなりました。

■ **出漁回数** 2023年の延べ出漁回数は7,411回で、前年の95%、過去10年平均の79%でした。また、2023年の1回出漁当たりの水揚金額は54.8万円で、前年の114%、過去10年平均の141%でした。

■ **産地価格** 水揚金額の多い上位40魚種について、1995年を100とする産地価格指数を計算したところ、2023年の指数は108.1で、前年(108.5)並みで、過去10年平均(87.5)を上回りました。過去10年平均に比べて、ズワイガニ雌(香箱ガニ)などの単価が低下したものの、ズワイガニ雄(加能ガニ)・アマエビ・ハタハタ・スルメイカなどの単価は上昇しました。

底びき網の水揚重量・金額・価格指数



石川県主要港の水揚状況 (期間:2月16日～29日)

■ **定置網** フクラギ・コゾクラ・カタクチイワシは前年を上回り、マイワシ・サバは前年を下回りました。マイワシは前年より少なかったものの、1995年以降で4番目に多い水揚量でした。

■ **まき網** サバ・マイワシ・フグ類は前年を上回りました。

■ **底びき網・ごち網** ハタハタは前年を上回り、アカガレイ・ズワイガニ雄は前年並み、ニギス・アマエビは前年を下回りました。

■ **刺網・釣り・その他** ベニズワイガニは前年並み、マダラ・ナマコ・フグ類は前年を下回りました。

※令和6年能登半島地震の漁業への影響が能登地域を中心に続いています。今年は前年同時期と漁業の状況が大きく異なることにご留意下さい。

集計期間 12月16日～12月31日

(単位:トン)

水揚港 魚 種	橋 立	金 沢	富 来	輪 島	珠洲 地区	宇出津	七 尾 地 区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
ぶり			0.0		4.9	265.7	169.1	439.7	119.5
しいら					1.3	20.3	73.8	95.4	16.4
ふくらぎ・こぞくら			2.0		1.8	1.9	28.3	34.0	7.5
さば					4.5	12.8	5.2	22.6	6.6
すずき			4.1		1.9	2.3	10.3	18.6	16.1
あおりいか					0.7	6.7	10.3	17.7	12.2
くろばんちょ(メヅナ)			0.0		0.1	1.0	7.3	8.4	4.1
さわら・さごし			0.0		0.5	2.5	5.2	8.2	22.8
ひらまさ			0.0		0.1	1.4	6.3	7.9	4.3
まあじ			0.0		0.2	1.3	3.7	5.3	12.2
その他			0.8		1.2	7.1	20.2	29.3	279.1
合 計	0.0	0.0	7.0	0.0	17.1	323.2	339.8	687.1	500.9
まき網									
ぶり	—	4.6				—		4.6	41.6
がんど	—	1.5				—		1.5	0.0
ふくらぎ・こぞくら	—	0.0				—		0.0	0.0
その他	—					—		0.0	0.1
合 計	—	6.1	0.0	0.0	0.0	—	0.0	6.1	41.7
底びき網・ごち網									
ずわいがに雌(香箱ガニ)	0.8	5.7	0.7	6.9	3.0		—	17.2	11.3
ずわいがに雄(加能ガニ)	1.7	3.7	0.6	3.7	5.0		—	14.7	13.6
あまえび	0.0	1.0	7.7	1.1			—	9.8	13.1
あかがれい	0.6	4.6	2.7	0.5	0.3	0.0	—	8.7	3.5
がすえび(トゲザエビ他)	0.0	0.9	3.9	0.1	0.0		—	5.0	2.7
みずうお(ノロゲンゲ)	0.0	0.8	1.4	0.1			—	2.3	1.2
ばいがい	0.2	1.3	0.2	0.2	0.3		—	2.2	2.3
にぎす			1.1				—	1.1	0.5
ふぐ類	0.0		0.8				—	0.8	0.0
なめたがれい(ヒレクロ)	0.0	0.4	0.2	0.2	0.1		—	0.8	0.8
その他	0.5	0.6	2.8	0.8	0.6	0.5	—	5.8	3.2
合 計	3.9	19.1	22.2	13.4	9.3	0.5	—	68.4	52.2
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		32.2	8.1	2.1				42.5	32.2
まだら				11.7		0.1		11.7	16.7
ぶり			0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	1.8	3.0
ふくらぎ・こぞくら			0.0	0.0	0.2	0.6	0.2	0.9	0.1
まだこ				0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	3.8
なまこ			0.0		0.1	0.5	0.1	0.8	0.8
あんこう						0.7		0.7	0.7
あかがれい				0.0		0.6		0.6	0.4
その他		0.0	0.2	2.0	0.7	1.9	1.6	6.3	7.8
合 計	0.0	32.3	8.4	15.8	1.0	4.8	4.0	66.3	65.5
小型いか釣り									
するめいか		0.2		0.7				0.9	2.8
総 計	3.9	57.6	37.7	30.0	27.4	328.5	343.9	828.8	663.1

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島・珠洲地区は一部未集計

集計期間 1月1日～1月15日

(単位:トン)

水揚港 魚 種	橋 立	金 沢	富 来	輪 島	珠洲 地区	宇出津	七 尾 地 区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
ぶり						81.1	97.7	178.9	50.3
ふくらぎ・こぞくら						6.5	48.5	55.1	55.0
さば						5.5	6.0	11.5	51.8
するめいか						0.0	6.5	6.5	25.1
さわら・さごし						1.2	5.3	6.5	17.9
そうだがつお						0.0	3.9	3.9	26.4
ひらまさ						0.2	3.1	3.3	1.7
あおりいか						0.2	1.5	1.6	3.8
すずき						0.5	0.8	1.3	9.3
かわはぎ(ウマヅラ)						0.0	0.9	0.9	4.9
その他						1.5	5.0	6.5	40.4
合 計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.7	179.2	276.0	286.6
まき網									
その他	—					—		0.0	58.0
合 計	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	58.0
底びき網・ごち網									
あかがれい	3.3	6.4					—	9.7	17.3
ずわいがに雄(加能ガニ)	1.2	3.1					—	4.3	7.4
あまえび	0.3	2.1					—	2.3	29.1
がすえび(トゲザコエビ他)	0.1	1.3					—	1.4	7.0
ばいがい	0.2	0.9					—	1.1	2.9
そうはち	0.2	0.3					—	0.5	4.1
なめたがれい(ヒレガニ)	0.1	0.4					—	0.4	1.3
みずうお(ノロゲンガ)	0.1	0.3					—	0.4	1.5
あんこう	0.1						—	0.1	1.1
はたはた	0.0	0.0					—	0.1	0.1
その他	0.3	0.1				0.3	—	0.6	23.5
合 計	5.8	15.0	0.0	0.0	0.0	0.3	—	21.1	95.3
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		28.8						28.8	31.9
あんこう						0.4		0.4	0.8
ばいがい		0.0						0.0	0.1
みずだこ						0.0		0.0	0.2
まだこ						0.0		0.0	3.4
なめらばちめ(キジハメ)						0.0		0.0	0.1
ひらめ						0.0		0.0	0.1
いしだい						0.0		0.0	0.0
その他						0.0		0.0	23.2
合 計	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	29.3	59.9
小型いか釣り									
するめいか								0.0	2.1
総 計	5.8	43.8	0.0	0.0	0.0	97.4	179.2	326.4	502.0

注:宇出津は松波港を含む、富来は一部未集計、珠洲地区は未集計

集計期間 1月16日～1月31日

(単位:トン)

水揚港 魚 種	橋 立	金 沢	富 来	輪 島	珠洲 地区	宇出津	七 尾 地 区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
ぶり			0.0			162.2	74.1	236.3	37.7
ふくらぎ・こぞくら			1.4			59.8	74.3	135.6	42.0
かたくちいわし						1.2	59.9	61.1	86.8
さば						4.3	15.9	20.2	8.6
するめいか						3.4	16.5	19.9	20.9
さわら・さごし						4.1	4.5	8.6	7.2
うるめいわし							6.3	6.3	1.2
かわはぎ(ウマヅラ)			0.0			0.9	3.9	4.8	7.1
まあじ						1.5	2.8	4.3	18.3
めじ(カマクノ)						1.4	2.5	3.9	9.2
その他			0.8			5.0	10.7	16.6	41.4
合 計	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	243.8	271.5	517.6	280.5
まき網									
その他	—					—		0.0	62.6
合 計	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	62.6
底びき網・ごち網									
あかがれい	26.5	12.4	4.3				—	43.2	18.2
あまえび	0.6	9.8	15.3				—	25.7	32.6
にぎす	0.2		13.5				—	13.7	18.1
ずわいがに雄(加能ガニ)	4.1	7.4	0.5				—	12.0	6.4
がすえび(トゲザコエビ 他)	0.2	2.8	2.5				—	5.5	3.7
ばいがい	1.3	2.8	0.1				—	4.1	1.6
みずうお(ノケソケ)	0.5	1.3	0.3				—	2.2	0.8
そうはち	1.0	0.9					—	1.9	3.7
白がすえび(クサコエビ)	1.1	0.1	0.2				—	1.4	0.5
なめたがれい(ヒレガニ)	0.3	0.9	0.1				—	1.3	1.5
その他	2.1	2.0	2.0				—	6.1	20.7
合 計	37.9	40.4	38.8	0.0	0.0	0.0	—	117.1	107.7
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		32.4						32.4	50.9
あかがれい						1.2		1.2	1.3
まだら						0.9		0.9	6.4
あんこう						0.7		0.7	0.7
なまこ		0.0				0.4		0.4	4.1
まだこ						0.2	0.1	0.2	2.4
ふくらぎ・こぞくら		0.0	0.2			0.0		0.2	0.0
あまえび			0.1					0.1	1.6
その他		0.1	0.0			0.6		0.6	10.9
合 計	0.0	32.5	0.3	0.0	0.0	3.9	0.1	36.7	78.5
小型いか釣り									
するめいか								0.0	4.5
総 計	37.9	72.9	41.4	0.0	0.0	247.7	271.6	671.5	533.7

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計

集計期間 2月1日～2月15日

(単位:トン)

水揚港 魚 種	橋 立	金 沢	富 来	輪 島	珠洲 地区	宇出津	七 尾 地区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
まいわし						401.9	909.2	1311.1	1733.4
ぶり						152.1	51.4	203.4	9.4
ふくらぎ・こぞくら			0.1			23.1	18.0	41.2	14.9
さば						3.9	22.1	25.9	302.4
かたくちいわし							24.9	24.9	5.4
するめいか						2.3	11.7	14.0	14.4
かわはぎ(ワマヅウ)						3.7	6.3	10.0	10.0
さわら・さごし						3.9	4.6	8.5	0.6
うるめいわし						0.7	6.8	7.5	0.0
まあじ						1.3	4.2	5.5	9.1
その他			0.3			5.6	10.0	15.8	27.9
合 計	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	598.4	1069.0	1667.8	2127.4
まき網									
さば	—	27.6				—		27.6	0.0
ふぐ類	—	2.4				—		2.4	0.1
まだい	—	0.0				—		0.0	0.9
その他	—	0.0				—		0.0	96.6
合 計	—	30.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	30.0	97.5
底びき網・ごち網									
あかがれい	24.6	8.2	3.4				—	36.2	53.2
あまえび	0.1	9.3	23.3				—	32.7	32.7
にぎす	0.1		22.9				—	23.0	27.1
がすえび(トゲザエビ他)	0.1	2.5	4.6				—	7.1	7.0
ずわいがに雄(加能ガニ)	2.6	4.0	0.1				—	6.6	15.9
ばいがい	0.5	1.7	0.1				—	2.2	4.6
そうはち	0.9	0.9					—	1.8	9.3
白がすえび(加サエビ)	0.8	0.1	0.8				—	1.7	1.8
まだい	0.0	1.6	0.0				—	1.6	1.0
まだら	0.7	0.5	0.3				—	1.5	7.2
その他	2.3	4.0	2.5				—	8.8	30.9
合 計	32.6	32.7	57.9	0.0	0.0	0.0	—	123.3	190.6
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		28.8						28.8	36.5
まだら			0.1			6.9		7.0	21.4
あまえび			1.2					1.2	3.1
あんこう						1.0	0.0	1.0	0.9
あかがれい						0.9		0.9	1.3
まだこ						0.2	0.4	0.7	2.1
なまこ			0.1			0.0	0.4	0.4	2.3
ぶり							0.4	0.4	2.2
その他		0.1	0.4			0.6	0.7	1.7	40.6
合 計	0.0	28.8	1.8	0.0	0.0	9.6	1.8	42.1	110.5
小型いか釣り									
するめいか						0.2		0.2	0.0
総 計	32.6	91.5	60.1	0.0	0.0	608.2	1070.9	1863.4	2526.1

注:宇出津は松波港を含む、富来は一部未集計、珠洲地区は未集計

集計期間 2月16日～2月29日

(単位:トン)

水揚港 魚種	橋立	金沢	富来	輪島	珠洲 地区	宇出津	七尾 地区	期間合計	
								本年	前年
定置網									
まいわし					100.0	918.4	970.2	1988.5	2622.0
さば			0.5		0.0	101.5	46.3	148.3	380.1
ふくらぎ・こぞくら			1.6		19.0	1.3	0.6	22.5	0.8
ぶり			0.0		4.7	0.7	2.6	8.0	21.2
するめいか					0.0	0.0	4.8	4.9	9.1
かたくちいわし						1.0	2.1	3.1	0.0
まあじ			0.0		0.0	0.2	2.7	3.0	6.6
かわはぎ(カマヅラ)			0.0		0.0	1.0	1.1	2.2	15.1
まだら			0.6		0.0	0.7	0.6	1.9	4.0
やりいか			0.0		0.0	0.1	1.1	1.2	1.6
その他			1.4		0.0	1.8	2.8	6.0	15.4
合 計	0.0	0.0	4.2	0.0	123.9	1026.6	1034.9	2189.6	3075.7
まき網									
さば	—	24.3				—		24.3	0.0
まいわし	—	23.1				—		23.1	0.0
ふぐ類	—	4.6				—		4.6	0.0
その他	—	0.1				—		0.1	35.0
合 計	—	52.2	0.0	0.0	0.0	—	0.0	52.2	35.0
底びき網・ごち網									
あかがれい	37.2	15.3	2.3				—	54.8	61.8
にぎす		2.5	11.8				—	14.3	30.2
ずわいがに雄(加能がニ)	4.5	6.2	0.0		0.0		—	10.8	13.3
あまえび	0.0	1.1	8.0				—	9.1	15.1
みずうお(ノダゴン)		2.2	1.5				—	3.6	4.2
そうはち	1.1	2.3					—	3.3	8.7
ばいがい	0.8	1.7	0.0				—	2.5	3.0
まだら	1.3	0.7	0.5				—	2.5	6.0
はたはた	0.2	1.0	0.8				—	2.0	1.1
なめたがれい(ヒレグロ)	0.2	1.5	0.1				—	1.8	4.1
その他	1.6	3.8	4.6				—	10.0	39.1
合 計	46.8	38.3	29.5	0.0	0.0	0.0	—	114.7	186.7
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		33.6						33.6	32.3
まだら		0.0				7.0	0.0	7.0	12.4
なまこ			0.1		0.1	3.6	0.1	3.9	10.2
ふぐ類	0.0		1.5			0.0		1.5	27.0
あまえび			1.0					1.0	2.8
あかがれい						0.9		0.9	1.5
ばいがい		0.0	0.4				0.0	0.5	0.8
くちぼそがれい(マガレイ)	0.0	0.4						0.5	0.2
その他	0.5	0.6	0.3		0.1	1.6	0.4	3.4	42.9
合 計	0.5	34.7	3.4	0.0	0.2	13.0	0.5	52.4	130.1
小型いか釣り									
するめいか								0.0	0.0
総 計	47.3	125.2	37.2	0.0	124.1	1039.6	1035.4	2408.8	3427.6

注:宇出津は松波港を含む、富来は一部未集計、珠洲地区は未集計